

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زرغون نوبت علمي - څېړنيزه مجله



د تاسيس كال: 1402 ل

د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون

1404 ل كال، دريم ټوك، اوله گڼه

د امتياز څښتن

د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون

د علمي مجلې آمر

پوهنمل دوكتور نواب ناصر

مسؤل مدير

پوهنمل اسدالله سعادت

عمومي مدير، ترتيب او ډيزاينر

دولت خان مسلم

د بورډ غړي

- پوهنوال نصيراحمد نصرت
- پوهنوال نقيب الله مجددي
- پوهندوي دوكتور امين الله نور
- پوهندوي دوكتور محمد داود باور
- پوهندوي احمد الله ظاهر
- پوهنمل دوكتور حكمت الله عبيد
- پوهنمل دوكتور شريف الله شريفی
- پوهنمل سردار محمد هاشمي
- پوهنمل محمد صادق صالحی

پته: د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، د څېړنو معاونيت

د علمي مجلې آمریت، د زرغون نوبت علمي مجلې دفتر، کندهار، افغانستان

www.anastu.edu.af

zarghoon.nawasht@anastu.edu.af

0705477590-0708712689

د چاپ حقوق يې خوندي دي.

- 10 - 1 به غواوو کي د طبق ناروغي او اقتصادي زیانونه
محمد هارون رحمانی، محمد داود باور، امین الله نور، رحیم الله امرخیل
- 26 - 11 د انارو تولید او د حاصل اغیزمنونکي فکتورونه: مروړي څېړنه
نواب ناصر، نجیب الله مجددي
- 40 - 27 د زمزم اوبو ترکیب، هایدرولوژی او روغتیایي گټې: مروړي څېړنه
لیکوالان: Boshra et al., 2021
- ژباړن: محمد یعقوب سرفراز
- 48 - 41 د څیړي پر نبات د حیواني سرې او نایتروجن نصبوونکو باکتریاو د اغیزو ارزونه مروړي څېړنه
شیراغا بهیر، قدرت الله احسان، مختار احمد فیض
- 59 - 49 د سرې ملی پر وده او حاصل باندي د کرلو د وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو اغېزې
محیب الله فیضي، فرید احمد ولي، نقیب الله مجددي، نجیب الله مجددي، صدیق الله احساس،
رحیم الله همت خواه، زاهدالله آرین، عنایت الله محمدي
- 66 - 60 د سوبابینو پر حاصل باندي د فاسفورس د بېلابېلو اندازو د اغیزو ارزبایي کول
نعمت الله دانش، خلیل الله زریال، قدرت الله احسان
- 78 - 67 د کروند گرو پر تولید د کرنيزي تکنالوژی اغیزې (د کندهار ولایت پنجوايي ولسوالی)
اسدالله سعادت، شجاع محمد کاکړ، عبدالهادي واصل، سردارولي شیرزاد، سید محمد کبیر مین
- د انگورو د نیمه سخت لرگینو قلمو د رینو پر تولید او وده باندي د کرنيزي مېډیا او ټپ جوړولو
اغېزې
- 89 - 79
لیکوالان: Hussein et al., 2020
- ژباړن: رحیم الله همت خواه

په غواوو کې د طبق ناروغي او اقتصادي زيانونه

محمد هارون رحمانی¹، محمد داود باور²، امین الله نور³، رحیم الله امرخیل¹

¹کلینیک څانگه، وترنري علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژی ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان
²پاراکلینیک څانگه، وترنري علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژی ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان
³پري کلینیک څانگه، وترنري علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژی ملي پوهنتون، کندهار،

افغانستان

* د مسؤل لیکوال ایمیل ادرس: haroon.Rahmani.hr@gmail.com

لنډيز

د طبق ناروغي په دوه سومه اهلي او وحشي څارويو کې يوه فوق العاده ساري ويروسي ناروغي ده. د ناروغي عامل د Picornaviridae کورنۍ په *Aphthovirus* جنس پوري اړه لري. ناروغي په مستقيم او غير مستقيم ډول د انتقال لويه وړتيا لري او د څارويو تر رغېدنې وروسته بيا هم په څارويو کې تاثيرات ليدل کيږي. طبق په ټوله نړۍ کې د واقعاتو او اقتصادي زيانونو د رامنځته کونکي په توگه پېژندل سوې. په افغانستان کې د طبق ناروغي لمړنۍ پېښې په 1962م کال کې ثبت او د هغه څخه وروسته د ځای ناروغي (Endemic) په توگه شتون لري. دا ناروغي په غواوو کې د مړينې او د څارويو په توليداتو کې د ملاحظې وړ کمښت په رامنځته کولو سره مالدارانو ته درانه اقتصادي زيانونه اړوي. د ناروغي په درملنه کې د Broad-spectrum Antibiotics (تيتراسايکلين) درمل په زرخي ډول استعمال د دوهمې عفونت په مخنيوي کې مرسته کوي. د کنترول لپاره يې 4% سوديم کاربونيټ، سرکه، تجارتي عضوي اسيدونه او په ازاد ډول د څارويو د گرځېدو مخنيوی ډېر مؤثریت لري. د مړه سوو واکسينونو استعمال تر شپږو مياشتو معافيت رامنځته کوي په کال کې د ناروغي په وړاندې دوه ځله واکسين تطبيق کول او د محيط حفظ الصحة مراعت کول د مخنيوي غوره کړنلاره ده.

کلیدي کلیمې: اقتصادي زيانونه، افغانستان، طبق ناروغي، غواوي

سريزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين .
 مالداري په ځانگړي ډول د غواوو روزنه او د دوی محصولات لکه شیدې، غوښه، د بار وړلو ظرفیت او فرعي محصولات د کلیوالو سیمو او مالدارانو په اقتصاد کي مهم رول لري. پرازيتي، باکتریايي او یا هم ویروسي ناروغي د څارویو صحت د متضرره کیدو ترڅنگ د هغوی د محصولاتو په تولید کي د ملاحظې وړ کمښت سبب گرځي (Abbas et al., 2025). د طبق ناروغي عامل په لمړي ځل 1897م کال کي د Frosch او Loeffler په واسطه کشف سو (Zewdie et al., 2023). طبق د افني تبي (Aphthousfever) په نامه سره هم یادیري. دا ناروغي په نړیواله کچه د دوه سومه څارویو د صحي ستونزو څخه شمېرل کیږي. د ناروغي عامل د picornaviridae کورنۍ اړوند د *Aphthovirus* جنس ویروس دی، چي په فارمي څارویو کي درانه اقتصادي زیانونه رامنځته کوي (Admassu et al., 2015; Eschbaumer et al., 2020). ویروس د اهلي او وحشي څارویو په خپل منځ کي په مستقیمه او غیر مستقیمه توگه د هوا له لاري په اسانۍ سره د انتقال وړتیا لري (Weaver et al., 2013). طبق ناروغي عامل د اوه ډوله (A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 او SAT 3) سیروټایپونو په درلودلو سره په ټوله نړۍ کي شتون لري. ټول ډولونه یې یو ډول ناروغي منځ ته راوړي ولي؛ ځيني وخت د ویرولس (د ناروغي د تولید توان) او د څارویو معافیتي سیستم د توپیر په اساس یو تر بل توپیر کوي. په ټوله کي یاده ناروغي د درنو اقتصادي زیانونو د رامنځته کونکي عامل په توگه پېژندل سوې (Abbas et al., 2025). وحشي او اهلي څاروي لکه غوا، مېښه، پسه او بز د دې ناروغي د حساسو څارویو له جملې څخه دي (Admassu et al., 2015). د ناروغي عامل د خولې او پښو د ټپونو په نوم پېژندلو سره په اسیا، افریقا او منځني ختیځ هیوادونو کي ډېري عامي پېښي رامنځته کوي مگر؛ د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کي د ناروغي عامل په مکمل ډول له منځه تللی (Azeem et al., 2020). د خولې، یزي شاوخوا، د خولې مخاطي غشا، ژبه، تیونو او گوتو تر منځ فاصله کي د ټپونو جوړېدلو کلینیکي نښو تر څنگ په بالغو څارویو کي د مړیني کچه لږ ولي؛ د څارویو په تولیداتو کي د اهمیت وړ کمښت راولي او همدارنگه د ناروغي کنترول د ستونزمنو او لگښت لرونکي گامونو څخه شمېرل کیږي، چي دا چاره د مالدارانو لگښتونه نور هم ډېروي (Eschbaumer et al., 2020).

د افغانستان مالداري او د طبق ناروغي مخینه

د افغانستان 80% وگړي د څارویو کوچنیو فارمونو په روزنه بوخت دي، چي له دې جملې څخه 90% کمزوري اقتصاد لرونکي مالداران په بر کي نیسي (Osmani et al., 2019). د 2020م کال د احصائیې او تخمین له مخي، په افغانستان کي شاوخوا 5.57 میلیونه غواوي، 12.5 میلیونه پسونه، 7.98 میلیونه بزې او نږدې 14 میلیونه کورني الوتونکي (Poultry) شتون لري (Samadi, 2025). په ټوله کي د افغانستان تر ټولو کوچنی او کمزوری اقتصاد لرونکی مالدار هم لږ تر لږه یوه غوا لري (Osmani et al., 2019). افغانستان د څلویښت کلن جنگ مخکي

کرنيز او د څارويو صادرونکي هيواد بلل کيده، ولي د څلويښتو کالو جگړو او شخړو له امله يې طبيعي سرچينې او سوداگريز سيستمونه د پوځي فعاليتونو، د خلکو بېخايه کيدل، د کرنيزو مخکو ښاري کيدل او وچکاليو سخت زيانمن کړي دي له همدې امله، هيواد د محصولاتو واردونکي گرځېدلی او همدارنگه د ډېرېدونکي تقاضا له امله د پاکستان هيواد سره 2640 کيلومتره اوږدې پولې له لاري د څارويو غير قانوني تگ راتگ د څارويو ساري ناروغيو ته زمينه برابره کړې (Wajid et al., 2020). او په همدې لړ کې د طبق A، O او Asia 1 سيروټايبونه په غواوو کې ناروغی او اقتصادي زيانونه رامنځته کوي (Ranjan et al., 2016). ياده ناروغي لومړی ځل په 1962م کال کې ثبت سوې خو؛ تر دې وړاندې په گاونډي هيواد پاکستان کې د پېښو راپورونه په 1954م کال کې ورکړل سو. له همدې امله داسي گومان کيږي، چې لا د وړاندې هم ناروغی شتون درلود (Osmani et al., 2019).

د ناروغی انتقال او گواښونکي فکتورونه

په طبق ناروغی مبتلا څاروي د تنفس له لاري ويروس هوا ته خپروي، سالمې غواوي عموماً د همدې هوائی ذراتو او شيدې خوږونکي خوسکي د مصاب څارويو د شيدو په واسطه د هضمي سيستم له لاري په ناروغی اخته کيدلای سي (Paton et al., 2018). د ناروغی عامل په 50 سانتي گراد گرمی، 55% لنډه بل او خنثی pH لرونکي محيط کې د اوږد وخت لپاره ژوندی پاته کيږي (Byomi et al., 2023). د دې تر څنگ، د ناروغی عامل په غير مستقيم ډول د ککړ محيط په واسطه روغو څارويو ته انتقاليري (Mielke & Garabed, 2020). د هوا جريان کولای سي عامل د قرنطين ساحې څخه نورو ساحو ته انتقال کړي، چې دا د ناروغی کنترول نور هم پېچلی کوي (Colenutt et al., 2022). د ناروغی گواښونکي فکتورونه Host, Virus, Environment پوري تړلي دي، چې له دې جملې څخه د کال فصل، د سيمي جغرافيه، آب و هوا، د ککړو وحشي څارويو شتون او د يوې ځانگړي سيمي او يا هم د سرحدونو څخه د ککړو څارويو محصولاتو انتقالول په چاپيريال او انساني فعاليتونو پوري تړلي. له بل اړخه د ويروس ډول، جنيتيکي جوړښت، د ناروغی رامنځته کولو توان او تر ډېره په چاپيريال کې د ژوندي پاته کيدو وړتيا په عامل پوري تړلي اغېزه لرونکي عاملونه دي. په ورته وخت کې د څاروي عمر، نسل، نوعه، معافيتي حالت او د حساسو څارويو شتون بيا د ميزبان پوري تړلي گواښونکي فکتورونه پېژندل سوي (Zewdie et al., 2023).


په څارويو کې د طبق ناروغی سير

د څارويو معافيتي عکس العمل، د ويروس سيروټايب او د ميزبان د نوعي په اساس ناروغي بېل سير او کلينيکي نښې نښي (Stenfeldt et al., 2014). په څارويو کې د ناروغی سير پدې ډول دي چې، ويروس د ميزباني حجراتو سره د خپل پروټيني پوښ د حجروي اخذو (Cellular receptors) له لاري نښلي او د څاروي حجراتو ته نوزي. عامل د حلقوم په مکوزي طبقه کې (Pharyngeal mucosa) د ځان کاپي جوړولو وروسته د لمفاوي او ويني دوراني سيستم په واسطه د خولې، پښو، غولانځي او پوستکي اپيټلي (Epithelial) انساجو

ته ځان رسوي (Burezq and Khalil, 2022). د ناروغي عامل په ټپونو کي تر ډېره پاته کيږي او تکثير کوي، چي دا د څاروي معافيتي سيستم کمزوري او دوهمي عفونت ته زمينه برابروي (Zewdie et al., 2023). د 24 څخه تر 48 ساعتونو وړاندي له دې، چي کلينيکي نښي راڅرگندي سي د څاروي د بدن گرمي يا تبه لوړيږي، د ناروغي پټه دوره کيدلای سي دوې اونۍ وخت ونيسي (Longjam et al., 2011). په غواوو کي د ناروغي عامي نښي د خولې څخه د لارو بهيدل (1 شکل A). په شيدو ورکولونکي غواوو کي د تيو تناکي (1 شکل B)، په ځانگړي ډول د گوتو په منځونو کي د ټپونو د جوړيدلو څخه عبارت دي (1 شکل C) کله چي څاروي د نږدې څه معاينه سي د څارويو د خولې منځنۍ برخه (Buccal cavity)، ايپيتلي پاڼه (Epithelial flaps)، زامي، سخت تالو او د ژبي په پورتنۍ برخه کي تناکي ليدل کيږي، چي په (1 شکل F,E,D) کي ښودل سوي دي (Lubroth, 2002).

د اخته کيدو او مړيني کچه

د طبق ناروغي عامل فوق العاده ساري خواص لري او د دوه سومه څارويو ډېر ډولونه د يادي ناروغي په وړاندي حساس دي (Gortázar et al., 2022). انسانان ددې ويروس په مقابل کي مقاوم دي (Chakraborty et al., 2014; Weaver et al., 2013). دا ناروغي د څاروي صحت او توليدات دواړه تر اغېز لاندې راولي، چي نتيجه يې په ټوله نړۍ کي د درنو اقتصادي زيانونو سره مل وي. د نړۍ تر سلو په ډېرو هيوادونو کي په دايمي (Endemic) شکل شتون لري (Jamal & Belsham, 2013). د ناروغي Incubation period يا پټه دوره د 2 څخه تر 14 ورځو پوري رسيري. د پښو او خولې د ټپونو ناروغي په بالغو څارويو کي ډېره لږه (1-5%) مړينه رامنځته کوي ولي؛ په ځوانو خوسکيانو او وريو کي د مړيني کچه د شل سلني څخه ډېریدلای سي. د اخته کيدو او مړيني کچه د څاروي نوعه، نسل، د توليد ډول، عمر، فردي معافيت او د څارويو د ساتلو تر شرايطو توپير لري مگر، حساس څاروي په ناروغي سل سلنه اخته کيږي کوم، چي په ځوانانو څارويو کي د زړه د عضلي التهاب په سبب لوړه مړينه رامنځته کوي (Azeem et al., 2020).



1- شکل: په غواگانو کې د طبق د ناروغۍ بېلابېلې نښې. (A) په طبق تر اخته کېدني د 12 تر 24 ساعته وروسته د هولیستن نسل غوا د خولې څخه پر فرش باندې د لارو بهېدل، (B) د طبق عفونت له امله د غوا په ټي کې د ټناکو رامنځته کېدل، (C) د طبق ناروغۍ له امله په دوه سومه څارویو کې د گوتو تر منځ سوروالی او ټپونو رامنځته کېدنه، (D) د طبق عفونت له امله د غوا پر زامه د ټپونو جوړېدل، (E) د طبق ناروغۍ له امله پر ژبه باندې د ټپونو رامنځته کېدنه، (F) په طبق د اخته کېدني 12 ساعته وروسته پر ژبه د ټناکو رامنځته کېدل (Lubroth, 2002).

تشخیص

عموماً، هغه څاروي چي د طبق ناروغي گمان پرې کيږي د کلينيکي نښو لکه د ژبي، پزي شاوخوا، خولې خاليگاه، د سومانو پورته برخي او غولانځي کي د ټپونو رامنځته کېدل، د وزن له لاسه ورکول، تبه، د اشتها کمښت، د خولې څه د لارو بهېدل، روحي خپگان (Depression) او د شيدو توليد کمښت نښو پر بنسټ کلينيکي تشخيص ترسره کولای سو (Fanda, 2023). د نښو راڅرگندېدل او د ټپونو جوړېدل په ځني فکتورنو لکه د څاروي نوعه، عمر، د عامل سيروټايپ، بدن ته د ننوتلو لار، په بدن کي د ويروسونو اندازه او د څاروي معافيتي سيستم پر بنياد توپير لري. همدارنگه د ځني نورو ناروغيو لکه د خولې التهابي ناروغي (Vesicular stomatitis) سره ورته نښي لري پداسي حال کي د کلينيکي نښو پر اساس د طبق ناروغي تشخيص ستونزمن وي (Niedbalski, 2016). د طبق ناروغي شکمنو پېښو دقيق تشخيص د لابراتواري ازموينو لکه Complement fixation test (CFT)، Virus isolation test، Virus neutralization test (VNT) او Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) په واسطه کولای سو ترلاسه کړو (Wong et al., 2020; Burezq and Khalil, 2022).

د ناروغي اقتصادي زیانونه

طبق ناروغي په څارويو کي په مستقيم او غير مستقيم ډول اقتصادي زیانونه رامنځته کوي (Singh et al., 2013). په مستقيم زیانونو کي د څارويو د شيدو کمښت، فزيکي ځواک يا بار وړلو، د وزن اخيستلو توان له لاسه ورکول، شنډتوب، د نسل يا رمې کمښت، د کمو توليداتو او ډنگر والي له وجي د څارويو په خرڅلاو کي ستونزي رامنځته کوي. همدارنگه په غير مستقيم زیانونو کي د واکسينونو رانيولو، د واکسينونو د انتقال، تشخيصي ازموينو، د څاروي خشره کول، ملي او بين المللي مارکيتونو ته د څارويو د انتقال محدوديتونه د طبق ناروغي د شديدو اقتصادي زیانو څخه شمېرل کيږي (González Gordon et al., 2022; Longjam et al., 2011). Ismail et al., 2023). د طبق له امله څارويو د نفوس کمښت، د څارويو او غوښي واردات ډېرېدل او د غوښي مصرف کمېدل د غواوو کرنيز اقتصادي ځنځير د اغيزمن کيدو سبب گرځي. ددې تر څنگ د طبق ناروغي په سبب منځ ته راغلي زیانونه کولای سي د فارمونو مالکين ذهني کلېوډ او اجتماعي ژوند اغيزمن کړي (Zewdie et al., 2023).

درملنه

په ناروغي اخته څارويو کي د سطحي ټپونو د درملني لپاره ميکروب وژونکو (Antiseptic) کارول او د دوهمي عفونت گواښونو د مخنيوي لپاره پراخ ټيپ لرونکي انټي بايوټيک (تيتراسايکلين) استعمال موثره دی همدارنگه، د دوهمي باکټريايي عفونت د مخنيوي لپاره د فارم حفظ الصحة مراعت کول د مهمو اقداماتو څخه گڼل کيږي (Azeem et al., 2020).

مخنيوی او کنترول

د طبق ناروغۍ کنترول او مخنيوی په ملي او بين المللي کچه جدي کړنو ترسره کولو ته اړتيا لري. طبق ناروغۍ فوق العاده انتقالېدونکې وړتيا لري. د ناروغۍ د مخنيوي غوره لاره د وژل سوي واکسينونو (Killed vaccine) استعمال دی، چي په څارويو کي تر شپږو مياشتو پوري معافيت رامنځته کوي. د کنترول لپاره د ټولو اخته څارويو له منځه وړل، عضوي تېزاب (Virkos S)، د 3-4% رقيقه سرکه (Vinegar) او 4% سوډيم کاربونيټ استعمال د ناروغۍ د خپرېدو په کنترول کي خورا مهم رول لري (Azeem et al., 2020 Ranjan et al., 2016).

پايله

طبق ناروغي د دوه سومه څارويو فوق العاده انتقالېدونکې ناروغي ده د اهلي او وحشي څارويو ترمنځ په مستقيم غير مستقيم ډول انتقاليري. انسانان د خولې او پښو ناروغۍ په وړاندي مقاوم او د انتقال گواښ (د انسان او څاروي تر منځ مشترک) د خپرېدو خواص نلري. طبق ناروغي په ډېري اسانۍ او چټکۍ سره د غواوو تر منځ انتقاليري او مالدارانو ته درانه اقتصادي زيانونه اړوي. ددې تر څنگ د طبق ناروغي کولای سي د مالدارانو اجتماعي ژوند هم اغيزمن کړي. د خولې او پښو د ټپونو ناروغي د خپلو ځانگړو کلينيکي نښو په واسطه په اسانۍ سره پيژندل کيدلای سي ولي؛ دقيق تشخيص يې لابرآتوري ازموينو ته اړتيا لري. د دوهمي عفونت د مخنيوي لپاره پراخ ټپ لرونکي انټي بايوټيک په ځانگړي ډول تيتراسکلين په زرقي ډول څارويو ته ورکول د دوهمي عفونت خطرونه کموي. د ناروغي د خپرېدلو د مخنيوي لپاره د مصاب څارويو په حلالولو او 4% سوډيم کاربونيټ ضد عفوني موادو په کارولو د طبق ناروغۍ عامل په محيط کي له منځه وړلای سو. د څارويو تر منځ د ناروغۍ د انتقال د مخنيوي لپاره څارويو ته په کتلوي ډول د مړه سوي واکسينونو استعمال د مخنيوي بڼه لاره ده.

سپارښتني

1. د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت او د وترنري علومو کارپوهان څېړونکي دي په افغانستان کي د طبق ناروغۍ د وروس د سيروتايپ په اړه څېړني ترسره کړي، تر څو په افغانستان کي د دې ناروغۍ ځانگړي سيروتايپونه په گوته سي.
2. د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت او مربوطه غير دولتي اورگانونه (NGOs) دي په افغانستان کي د ځانگړي سيروتايپ واکسينونه افغانستان ته وارد او مالدارانو ته په کلني ډول توضع او روغو څارويو ته تطبيق او ناروغ څاروي مسلخ ته سوق کړي.
3. د ناروغۍ د پېښو په جريان کي مالداران بايد خپل څاروي په فارمونو او غوچلو کي په بند شکل وساتي، تر څو ناروغ څاروي د ناروغۍ عامل محيط ته خپور نکړي او روغ څاروي د ناروغۍ څخه په امن وي.

4. د گمرکونو عمومي رياست او ښاروالي بايد هغه سرحدونه او سيمي، چي د ناروغي پېښي پکښي رامنځته سوي وي يا د ناروغي انډيمک هيوادونه يا سيمي پېژندل سوي وي د هغو هيوادونو او سيمو څاروي قرنطين او هيواد ته يې د محصولاتو د وارداتو مخه ونيسي.

اخځليکونه

- Abbas, R. Z., Ambrose, S., Khan, A. M. A., Mobashar, M., & Mohamed, K. (2025). Nanoparticles as an Alternative Strategy to Control Foot and Mouth Disease Virus in Bovines. In *Biological Trace Element Research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s12011-025-04533-0>
- Admassu, B., Getnet, K., Shite, A., & Mohammed, S. (2015). Review on Foot and Mouth Disease: Distribution and Economic Significance. *Academic Journal of Animal Diseases*, 4(3), 160–169. <https://doi.org/10.5829/idosi.ajad.2015.4.3.95165>
- Azeem, A., Rashid, I., Hassan, M. M., Asad, M., Kaukab, G., & Tehseen, A. (2020). A review on foot and mouth disease in dairy animals , etiology , pathogenesis and clinical findings. *Pure Appl. Bio*, 9(1), 821–832. <https://doi.org/10.19045/bspab.2020.90088>
- Burezq, H., & Khalil, F. (2022). Foot and Mouth Disease: A Review. *Indian Veterinary Journal*, 99(11), 7–19.
- Byomi, A., & Zidan, S. (2023). Epidemiological Patterns of Foot and Mouth Disease in Egypt and Other African Countries. *Journal of Current Veterinary Research*, 5(1), 250-282.
- Chakraborty, S., Kumar, N., Dhama, K., Verma, A. kumar., Tiwari, R., Kumar, A., Kapoor, S., & Singh, S. vir. (2014). Foot-and-Mouth Disease, an Economically Important Disease of Animals. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 2(2S), 1–18. <https://doi.org/10.14737/journal.aavs/2014/2.2s.1.18>
- Colenutt, C., Brown, E., Paton, D. J., Mahapatra, M., Parida, S., Nelson, N., Maud, J., Motta, P., Sumption, K., Adhikari, B., Kafle, S. C., Upadhyaya, M., Pandey, S. K., & Gubbins, S. (2022). Environmental sampling for the detection of foot-and-mouth disease virus and peste des petits ruminants virus in a live goat market, Nepal. *Transboundary and Emerging Diseases*, 69(5), 3041–3046. <https://doi.org/10.1111/tbed.14257>
- Eschbaumer, M., Vöglin, A., Paton, D. J., Barnabei, J. L., Sanchez-Vazquez, M. J., Pituco, E. M., Rivera, A. M., O'Brien, D., Nfon, C., Brocchi, E., Bakkali Kassimi, L., Lefebvre, D. J., Navarro López, R., Maradei, E., Duffy, S. J., Loitsch, A., De Clercq, K., King, D. P., Zientara, S., ... Beer, M. (2020). Non-discriminatory Exclusion Testing as a Tool for the Early Detection of Foot-and-Mouth Disease Incursions. *Frontiers in Veterinary Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fvets.2020.552670>
- Fanda, Y. S. (2023). A review on foot and mouth disease and its economic significance in Ethiopia. *Int. J. Curr. Res. Chem. Pharm. Sci*, 6(4), 27–32. <https://doi.org/10.5829/idosi.ajad.2023.48.59>
- González Gordon, L., Porphyre, T., Muhanguzi, D., Muwonge, A., Boden, L., & Bronsvoort, B. M. de C. (2022). A scoping review of foot-and-mouth disease risk, based on spatial and spatio-temporal analysis of outbreaks in endemic settings. *Transboundary and Emerging Diseases*, 69(6), 3198–3215. <https://doi.org/10.1111/tbed.14769>
- Gortázar, C., Barroso, P., Nova, R., & Cáceres, G. (2022). The role of wildlife in the epidemiology and control of Foot-and-mouth-disease And Similar Transboundary (FAST) animal diseases: A review. In *Transboundary and Emerging Diseases* (Vol. 69, Issue 5, pp. 2462–2473). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/tbed.14235>
- Ismail, I., Indarjulianto, S., Yusuf, S., & Purba, F. Y. (2023). Clinical Examination of Foot and Mouth Disease of Dairy Cows in Sukamurni, Cilawu, Garut, West Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1174(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1174/1/012005>

- Jamal, S. M., & Belsham, G. J. (2013). Foot-and-mouth disease: past, present and future. *Veterinary research*, 44(1), 116. <https://doi.org/10.1186/1297-9716-44-116>
- Longjam, N., Deb, R., Sarmah, A. K., Tayo, T., Awachat, V. B., & Saxena, V. K. (2011). A brief review on diagnosis of foot-and-mouth disease of livestock: Conventional to molecular tools. In *Veterinary Medicine International* (Vol. 2011). <https://doi.org/10.4061/2011/905768>
- Lubroth, J. (2002). Foot-and-mouth disease. *Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice*, 18(3), 475–499. [https://doi.org/10.1016/S0749-0720\(02\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0749-0720(02)00036-1)
- Mielke, S. R., & Garabed, R. (2020). Environmental persistence of foot-and-mouth disease virus applied to endemic regions. *Transboundary and Emerging Diseases*, 67(2), 543–554. <https://doi.org/10.1111/tbed.13383>
- Niedbalski, W. (2016). Recent progress in the diagnosis of foot-and-mouth disease: Rapid field-based assays. *Medycyna Weterynaryjna*, 72(6), 339–344. <https://doi.org/10.21521/mw.5524>
- Osmani, A., Robertson, I. D., Habib, I., & Aslami, A. A. (2019). History and epidemiology of foot-and-mouth disease in Afghanistan: A retrospective study. *BMC Veterinary Research*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12917-019-2119-y>
- Paton, D. J., Gubbins, S., & King, D. P. (2018). Understanding the transmission of foot-and-mouth disease virus at different scales. In *Current Opinion in Virology* (Vol. 28, Issue Figure 2, pp. 85–91). The Authors. <https://doi.org/10.1016/j.coviro.2017.11.013>
- Ranjan, R., Biswal, J. K., Sharma, G. K., & Pattnaik, B. (2016). A Review on Foot-and-mouth disease: pathology, diagnosis and its management. *Indian Journal of Veterinary Pathology*, 40(2), 105. <https://doi.org/10.5958/0973-970x.2016.00025.0>
- Samadi, A. (2025). Opportunities and Challenges to Afghanistan's Self-sufficiency in Livestock Production Sector. *Journal of Natural Science Review*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.62810/jnsr.v3i2.224>
- Singh, B., Prasad, S., Sinha, D. K., & Verma, M. R. (2013). Estimation of economic losses due to foot and mouth disease in India. *Indian Journal of Animal Sciences*, 83(9), 964–970. <https://www.researchgate.net/publication/270215319>
- Stenfeldt, C., Pacheco, J. M., Rodriguez, L. L., & Arzt, J. (2014). Early events in the pathogenesis of foot-and-mouth disease in pigs; identification of oropharyngeal tonsils as sites of primary and sustained viral replication. *PLoS ONE*, 9(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106859>
- Wajid, A., Chaudhry, M., Rashid, H. Bin, & Gill, S. S. (2020). Outbreak investigation of foot and mouth disease in Nangarhar province of war - torn Afghanistan , 2014. *Scientific Reports*, 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-70489-x>
- Weaver, G. V., Domenech, J., Thiermann, A. R., & Karesh, W. B. (2013). Foot and mouth disease: A look from the wild side. *Journal of Wildlife Diseases*, 49(4), 759–785. <https://doi.org/10.7589/2012-11-276>
- Wong, C. L., Yong, C. Y., Ong, H. K., Ho, K. L., & Tan, W. S. (2020). Advances in the Diagnosis of Foot-and-Mouth Disease. *Frontiers in Veterinary Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00477>
- Zewdie, G., Akalu, M., Tolossa, W., Belay, H., & Deresse, G. (2023). A review of foot - and - mouth disease in Ethiopia : epidemiological aspects , economic implications , and control strategies. *Virology Journal*, 1–24. <https://doi.org/10.1186/s12985-023-02263-0>

Foot-and-Mouth Disease in Cattle and its Economic Impacts

Mohammad Haroon Rahmani^{1*}, Mohammad Dawood Bawer², Aminullah Noor³,
Rahimullah Amerkhail¹

¹Department of Clinic, Faculty of Veterinary, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

²Department of Para-clinic, Faculty of Veterinary, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

³Department of Pre-Clinic, Faculty of Veterinary, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: haroon.Rahmani.hr@gmail.com

Abstract

Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious viral disease affecting both wild and domestic cloven-hoofed animals. The causative agent of FMDV belongs to the genus *Aphthovirus* of the Picornaviridae family. The FMDV has a high potential for direct and indirect transmission between cattle and other farm animals through the respiratory and digestive systems, and its effects remain in the animals even after they have recovered. FMD is recognized worldwide as a disease responsible for outbreaks and considerable economic losses. In Afghanistan, the first cases of FMD were reported in 1962, and since then, the disease has remained endemic in the country. In Afghanistan, livestock and livestock products constitute the primary source of income for the majority of the population. However, most farmers still practice traditional animal husbandry, and as a result, nearly 90% of them, due to weak economic conditions, face numerous financial challenges. Foot-and-mouth disease (FMD) not only causes mortality in cattle but also leads to significant reductions in livestock production, thereby imposing substantial economic losses on farmers. In treatment, the injectable use of broad-spectrum antibiotics (such as tetracycline) can help prevent secondary infections. For control measures, disinfectants such as 4% sodium carbonate, vinegar, and commercial organic acids, along with restricting the free movement of animals, have shown considerable effectiveness. The use of inactivated (killed) vaccines in cattle provides immunity for up to six months, and applying vaccination twice annually, combined with maintaining environmental hygiene, represents the most effective strategy for preventing the disease in cattle.

Keywords: Afghanistan, Cattle, Economic Impacts, Food and Mouth Disease

د انارو توليد او د حاصل اغيزمنونکي فکتورونه: مروري څېړنه

نواب ناصر¹، نجيب الله مجددي¹

¹هارتيکلچر څانگه، نباتي علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، کندهار،

افغانستان

* د مسؤل ليکوال ايميل ادرس: nasir.redtomato@gmail.com

لنډيز

انار يوه مهمه اقتصادي او تغذيوي ميوه ده چې په نيمه وچو او وچو سيمو کې په پراخه کچه کرل کيږي. سره له دې چې دا نبات په مختلفو اقليمي شرايطو کې ښه توافق کوي، خو حاصل يې د بېلابېلو فکتورونو له کبله په مختلفو سيمو کې توپير لري. دا مروري څېړنه هغه مهم فکتورونه لکه اقليمي شرايط، د خاورې څانگېتياوې، د اوبو مدیریت، اګرانوميکي فعاليتونه، او ژوندي فشارونه (آفات او ناروغۍ) چې د انارو حاصل اغېزمنوي، تشریح کوي. اقليمي فکتورونه لکه د تودوخې بدلون، وچکالي، اورښت، نسبتې لنډه بل او لمريز وړانگې د مېوې په وده، فزيولوژي او حاصل باندې ژورې اغېزې لري. د خاورې حاصلخيزي، مالګينوالی او د اوبو لگولو طريقي د عناصرو جذب، د نبات وده او حاصل په مهمه کچه اغېزمنوي. همدارنگه عصري اګرانوميکي کرنې لکه د څاخکو د اوبو لگولو سيستم، د اوبو سره يوځای د سرې ورکول، ښاخبري او متوازنه تغذيه د حاصل او کيفيت په ښه کولو کې مهم رول لري، خو ناسم مدیریت د پام وړ زيانونه رامنځته کوي. ژوندي فشارونه لکه مهمې ناروغۍ (bacterial blight او Anthracnose) او افتونه د بېلګې په ډول د ميوې Borer او Aphids حاصل په لوړه کچه راکموي چې کله تر 95% دا ضايعات رسيږي. همدارنگه د حاصل ټولولو وخت هم ډېر مهم دی چې د ميوې کيفيت، د ذخيره کولو وړتيا او د مارکيټ وړتيا ټاکي، چې د حاصل ټولولو ځنډول د ميوو چاوديدل او د حاصل کمول رامنځته کوي. په پایله کې، د انارو حاصل او کيفيت د اقليمي، خاورې، مدیریتي او بيولوژيکي فکتورونو تر اغېز لاندې دي او د دې فکتورونو مناسب مدیریت د لوړ او پایدار توليد لپاره ضروري دی.

کلیدي کليمي: اقليمي فکتورونه، انار، توليد، د ميوو کيفيت، ژوندي فشارونه

سريزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين.

انار (*Punica granatum L.*) د اقتصادي او تغذوي پلوه يوه مهمه ميوه گڼل کيږي چې په نړيواله کچه د خوړونکو دانو، جوسو او طبي ارزښت له مخې کرل کيږي. دا له ډېرې پخوا مودې څخه کرل کيږي او د انتي اکسيدات د مرکباتو او همدارنگه په عنعنوي طب لکه ايوريدا او يوناني طب کې د استعمال له اړخه ډير اهميت لري (Venkitasamy et al., 2019; Ain et al., 2023). انار په نړيواله کچه تقريباً په 300000 هکتاره ځمکه کرل کيږي او تقريباً 3 ميليونه ميټريک ټنه کلنی توليد لري (Venkitasamy et al., 2019).

د انارو د 500 څخه زيات کلتيوورونه پيژندل شويدي کوم چې د ميوې د اندازې، د دانو د رنگ، د تخم د سختوالي، پوخوالي او د جوسو د موادو له پلوه سره توپير لري (Ain et al., 2023). انار په باغونو کې د کوچني قد په لرلو سره چې تقريباً له 4 مترو کم وي روزل کيږي او دا چې په مختلفو اقليمي شرايطو کې توافق کولی شي نو ځکه په بېلابېلو ساحو کې کرل کيږي (Tyagi and Tiwari, 2017, pp. 1-2). نوموړې ليکوالان زياتوي چې دا نبات په ايران او د هغې په شاوخوا سيمو کې منځته راغلی دی، چې بيا مرکزي او جنوبي اسيا، مديتراني سواحلو، شمالي افريقا او وروسته امريکا ته د تجارت او مهاجرت د لارې خپور شويدي. نن ورځ انار د دنيا په مختلفو هيوادونو لکه ايران، هندوستان، افغانستان، چين، مديتراني اروپا او امريکا کې کرل کيږي. هندوستان د نړۍ تر ټولو لوی توليدونکی هيواد گڼل کيږي، چې تقريباً 131000 هکتاره ځمکه باندې يې انار کرل کيږي او په کال کې 1346000 ټنه چې په هکتار په متوسط ډول 10.27 ټنه کيږي، توليد لري (Sonawane, 2017). دا چې هندوستان دومره لوړ توليد لري له دې سره بيا هم ډېره کمه برخه يې صادريږي، ددې برعکس په ځينو هيوادونو لکه هسپانيه کې چې هم د توليدونکي او صادرونکي په حيث غټ رول لري، کوم چې په نړيوال بازار کې مشهور کلتيوورونه لکه Mollar de Elche او Valenciana لري، چې دا د انارو د اقتصاد او کرنې اهميت په گوته کوي (Bartual et al., 2015). د انارو د پراخه جغرافيې خپرېدا، د کرلو اوږد تاريخ او د مارکيټ د تقاضا د زياتوالي له امله په وچو او نيمه وچو منطقو کې يو ډېر مهم نبات گڼل کيږي.

سره له دې چې انار د پراخ جغرافيې خپرېدو، لوړ اقتصادي ارزښت او د اقليمي شرايطو سره د ښه توافق وړتيا لري، خو د دې نبات حاصل او کيفيت په بېلابېلو سيمو کې يو شان نه وي. د انارو توليد د گڼو فکتورونو تر اغېز لاندې راځي، چې پکې اقليمي شرايط، د خاورې ځانگړتياوې، اوبه لگونه، تغذيه، د نبات روزنه او ښاخبري کول، د گل او مېوې تنظيم، افتونه او ناروغۍ، او د مديريت کړنلارې شاملې دي (Singh et al., 2020; Adiba et al., 2025). په ناسم مديريت او نامناسب محيطي شرايطو کې، سره له لوړ توليدي پوتنسياله، د انارو حاصل د پام وړ کمېدای شي. له همدې امله، د هغو مهمو فکتورونو پيژندنه او ارزونه چې د انارو په حاصل اغېز لري، د دوامدار توليد، لوړ کيفيت او اقتصادي گټې لپاره حياتي ارزښت لري، دا مقاله د همدې موخې لپاره د انارو د توليد او حاصل اغېزمنونکو فکتورونو ته هر اړخيزه کتنه وړاندې کوي.

د انارو نړيوال توليد ته عمومي کتنه

انار د نړۍ په وچو او نيمه وچو سيمو کې د مهمې ميوې په توگه کرل کېږي او په وروستيو لسيزو کې يې توليد زيات شويدي، ځکه چې د تازه مصرف او پروسس شويو محصولاتو غوښتنه يې زياته شویده (Meshram et al., 2019). د نوموړو ليکوالانو د وينا په اساس، دا په پراخه کچه په هندوستان، ايران، چين، ترکيه، امريکا، هسپانيه، ازربايجان، ارمنيا، افغانستان، ازبکستان، منځنی ختيځ، پاکستان، تونيسيا، اسرايل او د جنوب ختيځي اسيا په وچو سيمو کې کرل کېږي، په کومو کې چې هندوستان تر ټولو لوی توليدونکی هيواد گڼل کېږي. د هندوستان او چين څخه وروسته ايران هم لوی توليدونکی هيواد گڼل کېږي، چې تقريباً 60000 هکتاره ځمکه د انارو د کرنې لاندې ده (Azizpanah et al., 2025). ترکيه، هسپانيه، اسرايل، تونيسيا او نور مدیتراني هيوادونه ساحوي توليدونکي دي، چې ترکيه په 2015 ميلادي کال کې تقريباً 445750 ټنه توليد لرلو (Şimşek, 2017). هسپانيه د اروپايي اتحاديي مخکښ توليدونکی دی چې په 2325 هکتاره ځمکه يې 27389 ټنه توليد لري (Coronado-Reyes et al., 2021). په امريکا براعظم کې د امريکا متحده ايالات لور توليدونکی هيواد دی، چې بيا دا توليد د چيلي، پيرو او مکسيکو هيوادونو په واسطه تعقيب شويدي (Day & Wilkins, 2011).

د انارو د روغتيايي گټو د شتون له امله ددې ميوې د محصولاتو تقاضا نوره هم زياته شويده چې په پايله کې د انارو د کرلو ساحه، توليد او صادرات هم پراخ شويدي په ځانگړې توگه په هندوستان کې چې د 2000 م کال راوروسته يې د پام وړ وده تجربه کړيده. د هندوستان د انارو د توليد ساحه د 125000 هکتاره څخه 750000 هکتاره ته کيدی شي چې په 2025 م کال پورې زياته شي چې له دې سره به د انارو په توليد کې لس چنده زياتوالی راشي (Pawar & Dingre, 2020). ملي او سيمه ييز معلومات ښيي چې په هغو سيمو کې چې پرمختللي مديریتي کرنې پلي شوي دي، د حاصلاتو تمايل مخ پر زياتېدو دی. د بېلگې په ډول، په مکسيکو کې توليد د 2013 او 2017 کلونو ترمنځ له شاوخوا 4,400 ټنو څخه 6,816 ټنو ته لوړ شوی، چې نږدې 43% زياتوالی ښيي، او دا په شاوخوا 630 هکتاره ځمکه کې ترلاسه شوی دی (Coronado-Reyes et al., 2021). په ترکيه کې هم د 2000-2010 کلونو په جريان کې دانارو عمومي توليد د پام وړ زيات شويدي (Şimşek, 2017). په کلفورنيا کې د تجارتي باغداری په کچه، د رسيدلو انارو عمومي حاصل چې په تازه شکل مصرفېږي نسبتاً ټيټ (6-10 ټنه په هکتار) وي، خو که بيا د جوسو په منظور استعمالېږي نو حاصل يې زيات (25-35 ټنه په هکتار) وي (Day & Wilkins, 2011). د انارو د تازه مصرف او جوسو استعمال دواړو دا نسبتې تغير د مارکيټ او په مني موسم کې د هوا په حالت پورې اړه لري.

د انارو په توليد باندې د توليد سيستمونه هم اغيز لري. په عمومي ډول دوه ډوله سيستمونه وجود لري يو عنعنوي او بل عصري سيستم. په زياتو هيوادونو کې عنعنوي سيستم لاندې ځانگړتياوي لري (Meshram et al., 2019; Day & Wilkins, 2011).

- د انارو د ونو شکل په صحيح ډول نه جوړېږي او په خپل حالت پريښودل کېږي چې غټي شي.

- اوبه خور يې په سطحي يا د سيلاب په شکل ترسره کيږي چې اکثرا وخت يې اوبه کول غير منظم وي او مهالویش يې معلوم نه وي.
- سره د اوبو سره يو ځای (Fertigation) ډيره کمه ورکول کيږي او بهرني تقويه کونکي لکه کيمياوي او عضوي سرې هم محدودې ورکول کيږي.
- اکثرا ددې باغونو توليدات د کورني مصرف لپاره وي نه د صادراتو لپاره. عصري سيستم په لاندې شيانو تمرکز لري.
- Micro-Irrigation (Drip Irrigation): د څاڅکي اوبو لگولو سيستم د انارو لپاره تر ټولو مناسب او مؤثر سيستم دی چې په دې سره د اوبو مصرف کميږي او حاصل ښه کيږي
- د اوبو له لارې سره ورکول (Fertigation): د اوبو لگولو له لارې د سرې ورکول د نبات د اړتيا وړ عناصر په اسانۍ سره برابروي.
- محدودې اوبه ورکول (Deficit Irrigation): ونو ته د اړتيا 75-80% اوبه ورکول چې په دې سره د اوبو د کارونې موثریت زياتيږي او د ميوې کيفيت لکه رنگ، شکر، خوند ورسره ښه کيږي.
- Crop-coefficient Based Irrigation Scheduling: د نبات د ودې او اقليم پر بنسټ د اوبو دقيق مهالویش او د اوبو او سرې اغېزمن استعمال
- Postharvest Management: د ميوې ساتنه، بسته بندي او ذخيره کول چې ورسره د کيفيت ساتنه او د ضايع کېدو مخه نيول کيږي.
- Export-Oriented Quality Management: د صادراتو لپاره د کيفيت معيارونه برابرول، ښه درجه بندي (Grading) او پاکوالی مراعتول.

د انارو په توليد او حاصل باندې د اقليمي شرايطو اغېزې

اقليمي شرايط لکه تودوخه، اورښت، وچکالي، نسبتې لنډه بل، رڼا او اقليمي تغير د انارو په حاصل، د مېوې په اندازه او کيفيت باندې ژورې اغېزې لري چې مهم اقليمي فکتورونه په لاندې ډول تشریح شويدي:

د تودوخې شديد بدلونونه

د تودوخې شديد بدلونونه د انارو پر حاصل، د مېوې په فزيکي او کيمياوي کيفيت باندې مهم او څو اړخيزې اغېزې لري. د بېلگې په ډول د انارو په دريو جينوتايبونو Wonderful، Sefri او Marsi باندې د دوه ډوله گرمي او ټيټې تودوخې اغېزې وڅيړل شوي (Adiba et al., 2025). په نتيجه کې د تودوخې ټيټې درجې دانارو په حاصل او د جو سو په کيفيت باندې په احصايوي لحاظ منفي اغېزې وښودلې. د Wonderful، Sefri او Marsi جينوتايبونو لپاره په ترتيب سره 35%، 37% او 57% د حاصل کمښت رامنځته شوی و. کيمياوي ځانگړنې لکه منحل جامد مواد (soluble solid content)، pH او titratable acidity يواځې په wonderful کلتور کې

اغيزمنې شوي وي چې دا اغېز بيا په Sefri کلتیور کې مهم نه و. همدارنگه د دريواره کلتیورونو په جوسو کې فینولیک مرکبات، انتوسیانين مواد او د هغوي انټي اکسیدانت فعالیتونه هم راکم شوي وو. ټیټی تودوخې د میوې فزیکي ځانگړتیاوې لکه د انار د دانو کیفیت او د جوسو مقدار راکم کړیدی. ټیټی تودوخې همدارنگه د انارو وده هم په فزیالوژیکي او هم په مولیکولري کچه اغیزمنه کړي په ځانگړې ډول د پسرلي په سر کې (Guan et al., 2022). په نوموړې څېړنه کې د انارو د پاڼو په فزیالوژیکي او مولیکولري برخه د یخې هوا دوه ډولونه (0°C او 6°C) و څیړل شو. په پایله کې هغه جینونه تشخیص شول کوم چې د یخ تر فشار لاندې یې غبرگون درلود او د هورمون سیگنالینگ، ضیایي ترکیب او د کاربوهایدریت میتابولیزم پروسې یې کنټرولولې. د یخ دواړو فشارونو حجرې زیانمنې کړي، د فوتوسنتزس مؤثریت یې کم کړو او منحلې بوره، پروټین او پرولین یې زیات کړو.


له بلې خوا، د تودوخې لوړې درجې او وچ اقلیم هم د انارو پر وده او د مېوې پر کیفیت منفي اغېز لرلو (Joshi et al., 2021). د نوموړو څېړنو پایلو وښودله چې شدیدې گرمي او وچ اقلیمي شرایط د مېوې د اعظمي ودې په پړاو کې د ودې سرعت محدودوي او د کوچنیو مېوو تناسب زیاتوي. سربېره پر دې، دغه شرایط د مېوې د پوستکي په جوړښت اغېزه کوي، چې په پایله کې یې د داخلي فشار پر وړاندې مقاومت کمېږي او د چاودنې (Cracking) او سطحي زیانونو احتمال زیاتېږي. همدارنگه دا اقلیمي شرایط د مېوې د ودې او د پوستکي میخانیکي ځانگړتیاوې تغیروي، چې نوموړې تغیرات په مستقیم ډول د مېوې پر کیفیت او بازارموندنې ارزښت باندې اغېز کوي.

باران، وچکالي او د اوبو کمښت

د اوبو کمښت، وچکالي، او د باران ناڅاپي بدلونونه د انارو په تولید، حاصل او د مېوې په کیفیت باندې ژورې اغېزې لري چې د اقلیمي بدلونونو له امله یې اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي. همدارنگه د نړۍ په کچه 70% تازه اوبه (Fresh Water) د زراعت په برخه کې مصرفیږي او د اوبو مختلفې منابعې د اقلیمي بدلون، ښاري پراختیا او صنعتي اړتیا له امله د نړیوالو ترمنځ رقابت زیات کړیدی چې په همدې اساس باید په صحیح شکل مدیریت شي (Porrás-Jorge et al., 2025). په داسې حالاتو کې د لږو اوبو استعمال (Deficit Irrigation) د اوبو د سپما لپاره اړین گڼل کیږي. د نوموړو څېړنو په پایله کې منظم د لږ اوبو لگولو سیستم (Regulated Deficit Irrigation) 10% اوبه وسپمولې په داسې حال کې چې د مارکیټ وړ حاصل او د مېوې په وزن باندې یې منفي اغېز نه درلود. خو د دوامداره لږ اوبو ورکولو سیستم (Sustained Deficit Irrigation) 50% اوبه وسپمولې په داسې حال کې چې د پام وړ حاصل او د ونو په وده باندې یې په ځانگړې ډول په گرمو او وچو سیمو کې منفي اغېز وکړو. همدارنگه د معتدل اوبو کمښت استعمال د انارو د میوو کیفیت لکه منحلې جامد مواد (Soluble Solids Content) زیات کړل او په ډېره کمه اندازه تقریباً 10% یې حاصل کم کړو، ولي شدید د اوبو کموالي سره د میوو کیفیت او حاصل دواړه په مهمه کچه کم شول (Hassan et al., 2025). په

یوه بله څېړنه کې چې اوږدمهاله یې لږې اوبه استعمال کړې وي، فوتوسنتیتیک فعالیتونه یې راکم کړ، د ستوماتا د بندیدو سبب شو، او په پایله کې یې د انارو وده او حاصل راکم کړو (Volschenk, 2021). په هغو شرایطو کې چې اوبه محدودې وي، نو معتدله او شدیدې وچکالي په مهمه کچه د ستوماتا د پرانستلو وړتیا کموي او له امله یې د کاربن جذب راتیټیري. په ځانگړې ډول، معتدله وچکالي د 19-36% د ستوماتا وړانسته کموي، ولي شدیدې وچکالي د 53-77% پورې د ستوماتا وړانسته کموي. په نتیجه کې دوامداره وچکالي چې په پرلپسې موسمونو کې رامنځته شي، د نبات وده، د میوو پرمختگ او د ټول باغ حاصلات په منفي ډول اغیزمنوي (Volschenk, 2021).

سربېره پر دې، د وچکالی او باران گډ اغېز د مېوې د کیفیت لپاره مهم دی، ځکه چې د وچکالی وروسته ناڅاپي باران د مېوې د پوستکي او د دانې (Arils) ترمنځ د فشار نا انډول رامنځته کوي، چې په پایله کې د مېوې چاودنې (Cracking) خطر زیاتوي (Galindo et al., 2014). نوموړو لیکوالانو د اوبو د مختلفو اندازو اغېزې د مېوې په وده او پوخوالي باندې وڅیړلې او د پانو او میوو د اوبو حالت یې ارزيايي کړو. پایلو وښودله چې د انارو میوه په دې دوران کې د اوبو د فشار سره ډېره حساسه ده، چې په نتیجه کې یې د انارو د میوو غټوالی راکم کړو. د اوبو دې فشار سره د میوو تورگور فشار کم شو خو ولي د پانې د تورگور فشار ثابت و. ډېره مهمه دا وه چې د وچکالی وروسته باران په تیزی او غیر منظم شکل د میوو داخلي فشار زیات کړو، ځکه چې دانو (Arils) د پوستکي څخه ژر اوبه جذب کړلې چې په نتیجه کې یې د میوو چاودیدل زیات کړل (شکل 1).



1- شکل: د اوبو فشار او باران اغېزې د انارو د میوو پر کیفیت باندې (Galindo et al., 2014)

نسبتي لنډه بل، لمريزې وړانگې او باد

نسبتي لنډه بل، لمريزې وړانگې او باد مهم مايکرواقلیمي فکتورونه دي چې د انارو حاصل، د میوو کیفیت او فزیالوژیکي فعالیتونه یې اغیزمنوي. لوړه تودوخه، او شدید د لمر وړانگې د میوو د پرمختگ په وخت کې مهم اغیزمونکي عوامل دي، چې بیا ځیني بې نظمې لکه لمر سوځیدنه، چاودیدل او د میوو د سطحې تخریب رامنځته کوي. مگر ځیني میتودونه لکه د سورې د جالونو استعمال لمر سوځیدنه د 41% څخه 12% ته راکمه

کړي او د ميوو چاوديدل يې د 27% څخه 11% راکم کړيدی. ددې تر څنگ يې د فوتوسنتز فعاليت، د اوبو حالت، او انتي اکسيدات فعاليتونو ته هم پرمختگ ورکړيدی (Moradi et al., 2025). په نوموړې څېړنه کې همدارنگې د تودوخې په مقابل کې د ونو مقاومت په پايو باندې د سليکون (Si) او پوتاشيم (K) د سپړی کولو سره زيات کرل شو. په ورته يوه بله څېړنه کې د ونو د پايو سپړی کول د عناصرو (B, Zn, Fe, Mn, Ca and Cu)، امينو اسيدونو او ليکوريس زوخي سره د ونو وده، د کلورفيل مقدار، د ميوې اندازه او په ټوله کې ټول حاصل ښه کړی وو، په داسې حال کې چې د لمر سوځيدنې او چاوديدلو خطر يې کم کړی نو ځکه په پايله کې د مارکيت د پام وړ حاصل زيات شو (Ahmad et al., 2024).

اقليمي فکتورونه لکه د تودوخې د حالت نامنظم لوړيدل او ټيټيدل او نسبتې لنده بل هم د ميوو د بې نظميو په رامنځته کيدو کې مهم رول لري. په ځانگړې ډول د تودوخې نامنظم لوړيدل او ټيټيدل د ميوو د چاوديدلو او د ميوو د پوستکي د بې نظميو اصلي عامل گڼل کيږي او نسبتې لنده بل د دغه بې نظميو حالت لا پسې نور هم خرابوي (Drogoudi et al., 2021). همدارنگه محيطي نور فکتورونه لکه باد، د بحر څخه لوړوالی (altitude) او اورښت د انارو د ميوې په فزيکي او بايوکيمياوي ځانگړنو قوي اغېز لري. هغه د انار ونې چې په غرنيزو سيمو کې کرل کيږي نسبت هغه ونو ته چې په معتدله هوا او وچو سيمو کې کرل کيږي زيات فينوليک مرکبات، انتوسيانين، انتي اکسيدات او ویتامين سي لري. دغه فکتورونه همدارنگه د ميوو د وزن، خوړونکي برخې، منحل جامد موادو او د ميوې د ټول کيفيت سره مستقيمي اړيکي لري (Ghasemi-Soloklui et al., 2023).

د خاورې ډول او حاصلخيزي، مالگينوالی، د اوبو کولو اندازې او pH اغېزې

د خاورې ډول او حاصلخيزي د انارو د ودې، حاصل او د ميوو پر کيفيت اساسي اغېزې لري. د بېلگې په ډول په يوه پنځه کلنه څېړنه کې چې د انارو په فعاليتونو باندې د مختلفو خاورو اغېزې ازمایل شوي وي، په پايله کې هغه ونې چې په دروند تکسچر لرونکو خاورو کې کرل شوي وي نسبت هغو ته چې په سپکو تکسچر لرونکو خاورو کې کرل کيدې، د زيات لگښته عناصرو جذب يې زيات کړی و، د کلوروفيل مقدار يې لوړ کړی او د نبات وده يې ښه کړي وه (Marathe et al., 2016). په نوموړې څېړنه کې لوړ حاصل په کليې خاورو چې ژوروالی يې 30 سانتي متره و ترلاسه شو، ولي کله يې چې ژوروالی د 90-120 سانتي مترو ته زيات شو، نو په پايله کې وده او حاصل په مهمه کچه راټيټ شو. ددې برخلاف د ښه کيفيت لرونکي ميوه په جغل لرونکو او شگلنو خاورو کې چې ژوروالی يې 60 سانتي متره و توليد شو. ناورغی لکه بکتريايي بلايت او وچيدل په کليې خاورو کې نسبت سپکو خاورو ته زياتي وي. که چېرته سطحې جغل لرونکي خاورې د محلي تورو خاورو سره مخلوطي شي او بيا په کندو کې د کرلو په موخه استعمال شي نو په دې سره به د انارو وده، حاصل، لوړ جوس لرونکې ميوې، منحل جامد مواد او پايداره حاصل په کمزورو ځمکو کې ترلاسه شي (Vadivel et al., 2024).

سربيره پر دې، د اوبو او خاورې حاصلخيزي هم د انارو په توليد کې مهم رول لري. بيوې څيړنې وښودله چې د اوبو کم مصرف (80% ETo) د عضوي او کيمياوي سرو د گډ استعمال سره نه يوازې حاصل زياتوي، بلکې د مېوې کيفيت او د اوبو د استعمال موثريت هم ښه کوي. په ځانگړي ډول، د 75% کيمياوي سرې او 25% عضوي سرې ترکيب د 80% ETo تر اوبو لاندې د حاصلاتو په زياتوالي کې اغېزناک تمام شو، او د بازار وړ مېو سلنه هم لوړه شوه (Abdel-Sattar et al., 2021). همدارنگه د خاورې مالگينوالي او pH هم د انارو په وده، حاصل او ميوو کيفيت باندې اغېز لري. دا چې وچکالي نړيواله ستونزه ده نو په همدې خاطر د خلکو فکر د لږو اوبو استعمال خواته اوږدېدلې دی، خو د لږو اوبو استعمال د خاورې په ځانگړي ډول د کليي خاورو د مالگينوالي د زياتيدو سبب گرځي (Okba et al., 2022). په نوموړې څيړنه کې د لږو اوبو (75%) د مقناطيسي اوبو (Magnetized Water) او پرولين گډ استعمال سره د انارو د پانو د کلوروفيل مقدار بهتر کړ، د ونو وده يې ښه کړه او حاصل يې زيات کړو. ددې ترڅنگ مقناطيسي اوبو د خاورې pH، EC، د سوډيم او کلسيم غلظت راکم کړو، چې ددې په نتيجه کې د خاورې د مالگينوالي فشار کم او د ونو مقاومت د مالگينو خاورو په مقابل کې زيات شو.

اگرانوميکي فعاليتونه او د مديريت اغيزې

اگرانوميکي فعاليتونه او د انارو مديريت هم د انارو په حاصل، ميوو کيفيت او د باغ په توليد مهمې تاثير لري. د بېلگې په ډول د ونو د کرلو مناسبه فاصله (3 x 4) د ونو کانوپي ښه کوي او په باغ کې د وسايلو د استعمال موثريت زياتوي او د دې ترڅنگ د Intercropping په استعمال سره د ټول باغ توليد ښه کوي او ځمکه په مؤثره توگه استعماليري (Soni et al., 2020). همدارنگه د عناصرو مديريت هم يو مهم فکتور دی چې د انارو د ودې او ميوو کيفيت لپاره اړين دي. د عضوي او غير عضوي سرو گډو استعمال په اوبو کې د انارو حاصل او د ميوو کيفيت ښه کوي. د بېلگې په ډول 75% د سرو استعمال د اوبو د لارې لوړ حاصل رامنځته کړ، د ميوو سايز يې زيات کړو او د ميوو کيفيت لکه اسکاربيک اسيد او فينوليک مواد يې غني کړل (Tanari et al., 2019). همدارنگه 75% کيمياوي سرې د 25% عضوي سرو د گډ استعمال په نتيجه حاصل لوړ کړو، د ميوو نيونه يې ښه کړه او ورسره د اوبو د استعمال موثريت ښه شو (Abdel-Sattar et al., 2021). همدارنگه په پانو د (K, Ca, B, Zn) عناصرو سپري کولو سره د ميو سايز، ټول منحل مواد ښه شو او ورسره د ميوو چاوديدنه او غورځيدنه راکمه شوه (Kumar et al., 2020; Abd El-Wahed et al., 2021). همدارنگه د Biostimulants او Organo منرالي سرو استعمال حاصل، ميوو کيفيت، او د خاورې حاصل خيزي ښه کړه (Sajjadullah., 2022; Tarantino et al., 2023).

د انارو په مديريت کې د هغوی ښاخبري هم مهم رول لري، لکه د دريو تنو ونو سيستم چې د ونې ښاخونو وده، گل کول، ميوه نيونه او د ميوو د کيفيت ځانگړنې يې بهتره کړي او ددې ترڅنگ ځيني نور سيستمونه لکه Modified Leader او Open Center سيستمونو د ميوو وزن، حاصل ښه کړو خو ولي د ميوو چاوديدل يې

راکم کړل (El-Bolok et al., 2023). ددې ترڅنگ د ښاخبري شدت هم د میوو په ځانگړتیاوو اغېز لري، چې زیاته ښاخبري د میوو د وزن د زیاتید سبب گرځي خو منځنۍ ښاخبري د میوو د کیفیت د ښه کیدو سبب گرځي (Ghatul et al., 2019). د انارو د ونو عمر، مناسب مدیریت او په ونه د میوو د تولید اندازه د باغ په تولید باندې ځانگړې اغیزې لري. د بېلگې په ډول په ونه باندې د 80 میوو روزل د میوو کیفیت لوړ کړو او د مارکیټ وړ تولید یې هم زیات کړو. ددې ترڅنگ یې د میوو چاودیدنه کمه شوه (Singh et al., 2024). د اوبو مدیریت په ځانگړې ډول په وچو سیمو کې ډېر مهم دی. د لږو اوبو استعمال (75-80%) سیستم د انارو د میوو حاصل، کیفیت او د اوبو مؤثره استعمال بهتره کړو، خو ددې ترڅنگ یې د میوو چاودیدل او لمر سوځیدنه راکمه کړه (Mousa et al., 2025). همدارنگه د ودې تنظیمونکو لکه سالیسیلیک اسید او نفتالین استعمال په وچو سیمو کې نور هم د میوو حاصل ښه کړو او د فشار په مقابل کې یې د ونو مقاومت زیات کړو (Jena et al., 2025) او په باغ کې د ملچ استعمال د اوبو نم ساتل او د میوو سایز بهتره کړو (Beelagi et al., 2023).

برعلاوه پرې دې د خاورې او رینسو ترمخ متقابل تعامل هم د عناصرو جذب او د انارو د میوو کیفیت اغېزمنوي. د خاورې په لاندې طبقه کې د کلیې د موادو زیات مقدار د عناصرو شتون او په نتیجه کې حاصل اغېزمنوي او د رینسو جوړښت د نبات توافق او د عناصرو راجمع کول تنظیموي (Muradoğlu et al., 2024). نو په همدې لحاظ د خاورې په نظر کې نیولو سره د انارو د باغونو د مدیریت فعالیتونه تنظیمول د انارو د پایداره تولید لپاره اړین دي.

په انارو باندې د ناروغیو او افتونو اغېزې

د انارو تولید او د میوو کیفیت یې د ژونديو فکتورنو لکه افتونه او ناروغیو په واسطه په مهمه کچه اغېزمنیږي. فنگسي او بکتریايي ناروغۍ لکه Wilt, Bacterial Blight او Anthracnose مهمې ناروغۍ دي چې ډېر اقتصادي زیانونه اړوي او په داسې حال کې چې د Anthracnose لپاره شرایط مساعد وي حتی تر 100% پورې حاصل کمولی شي (Chandana et al., 2024; Munhuweyi et al., 2016; Jain & Desai., 2018). د حاصل ټولولو وروسته ناروغۍ لکه Grey Mold, Blue Mold, Black Rot او Anthracnose نور هم حاصل اغېزمنوي په ځانگړې ډول د ذخیري او مارکیټ په وخت کې (Mincuzzi et al., 2022). د افتونو له ډلې څخه حشرات لکه Butterfly, Fruit Borer او Fruit Sucking Moth گلان او میوه متضرره کوي چې ورسره میوه او حاصل کميږي (Chandana et al., 2024). د بېلگې په ډول *Schizonycha ruficollis* بالغه حشره چې په گلانو تغذیه کوي تقریباً 7% حاصل د منځه وړي (Rashmi et al., 2024). نور تغذیه کوونکي حشرات لکه Aphids, Thrips, Mealybugs او Mites چې د نبات انساج متضرره کوي او په نتیجه کې حاصل او د میوو کیفیت متضرره کوي (Elango et al., 2021; Dewangan & Gupta, 2023).

د ناروغیو او افتونو له امله د انارو د حاصل زیانونه ډېر لوړ دي چې د 15-20% یواځې د حاصل ټولولو وروسته رامنځته کیږي او کله کله په شدیدو حالاتو کې دا 95% ضایعات رامنځته کوي (Opara et al., 2021; Guliev & Huseinova, 2020). د ناروغیو او افتونو د مخنیوي مشترکه سیستم چې په هغې کې فنګس وژونکي، بایوکنترول مواد، او نباتي زوخي (Plant Extracts) شاملې دي په مؤثره توګه افتونه او ناروغی راکمي کړيدي او په عوض کې یې حاصل او ټول تولید ښه کړیدی (Tyagi et al., 2021; Lokure et al., 2024; Raja et al., 2023).

د حاصل ټولولو مربوط فکتورونه چې حاصل اغیزمنوي

دا هم د انارو په تولید او کیفیت باندې مهم رول لوبوي، ځکه چې د حاصل ټولولو ځنډول (د گل کولو څخه وروسته، د 155 څخه 185 ورځو ته) د میوې وزن، د جوسو مقدار، منحل جامد مواد، ذایقه او د اتوسیانین اندازه ښه کوي لیکن ددې سره د میوو چاودیدل زیاتیري او د میوو ضایعات صورت نیسي (Narjesi et al., 2025). نو ځکه مناسب د حاصل ټولولو وخت د میوو د پوخوالي په ځیني عواملو لکه منحل جامد مواد، اسیدیتي او د میوو په رنګ پورې اړه لري (Boussaa et al., 2019; Babu et al., 2017). وختي حاصل ټولول د میوو کیفیت کمزوری کوي او نا وخته حاصل ټولول د ذخیري وخت راکموي او ضایعات زیاتوي (Babu et al., 2017).

د میوو چاودیدل او لمر سوځیدنه د وختي حاصل ټولونې نښې دي چې د حاصل د ضایعاتو مهم عوامل دي چې د بازار وړ حاصل کموي چې دغه ستونزې د مناسب تغذیوي موادو په مدیریت او کلسیم، پوتاشیم او د کاولین په استعمال سره کمیدی شي (Al-Saif et al., 2022). همدارنګه د حاصل ټولولو مخکې د سالیسیلیک اسید استعمال حاصل، میوو کیفیت او د حاصل ټولولو وروسته فعالیتونه ښه کوي (Garcia-Pastor et al., 2020).

پایله

د انارو تولید او حاصل باندې اقلیمي شرایط، بیولوژیکي او مدیریتی فکتورونه د پام وړ اغېزې لري. اقلیمي شرایط، په ځانګړې ډول د تودوخې لوړیدل او ټیټیدل، وچکالي، نسبتي لنډه بل، اورښت او لمريزې وړانګې د انارو تولید او حاصل ډېر اغیزمنوي. د خاورې ډول او ځانګړتیاوې، د غذايي موادو شتون د نبات په وده او حاصل باندې مهم رول لري. ددې ترڅنګ د اوبو لګولو مناسب سیستمونه او عصري اګرانوميکي کړنې د اوبو او سرې موثریت لوړوي. همدارنګه د افتونو او ناروغیو شتون هم د انارو تولید محدودوي او د پام وړ زیانونه رامنځته کوي. برعلاوه د حاصل ټولولو ناسم وخت او ناسم مدیریت د بازار وړ حاصل کموي. نو ځکه د انارو د پایداره تولید او حاصل لپاره یوه منظم او څو اړخیزه کړنو ته لکه مناسب محطبي شرایط، د انارو د کرلو عصري او منظم فعالیتونه، د افتونو او ناروغیو په وړاندې جدي کار کول تر څو د انارو لوړ حاصل ترلاسه شي.

سپارښتني

د انارو د لوړ توليد او حاصل لپاره د لاندي سپارښتونو توصيه کيږي.

1. د اقليمې شرايطو سره مناسب کلتیورونه انتخابول او کرل
2. د باغ د خاورې د حاصلخیزۍ لپاره د عضوي او غیر عضوي سرو مناسب استعمال
3. د افتونو او ناروغیو د کنترول او مخنيوي لپاره د گډ او مشترکه مدیریت ترسره کول
4. په باغونو کې د اوبو د مؤثره استعمال لپاره د څاڅکو د اوبو لگولو سیستم استعمالول
5. د لوړ او باکیفیته حاصل د ترلاسه کولو لپاره د سمې ښاخبرۍ او د ونې د کانوپی منظم مدیریت کول
6. په مناسب وخت کې د حاصل ټولول چې د میوي د پخیدو ځانگړتیاوو په نظر کې نیولو سره حاصل ټولیري.
7. د حاصل راټولولو وروسته د حاصل منظم مدیریت کول

اخځلیکونه

- Abd El-Wahed, A. N., Abd-Alrazik, A. M., & Khalifa, S. M. (2021). Effect of some nutrients on growth, Yield and fruit quality of “Wonderful” cultivar pomegranate. *Al-Azhar Journal of Agricultural Research*, 46(1), 1-15.
- Abdel-Sattar, M., Almutairi, K. F., Aboukarima, A. M., & El-Mahrouky, M. (2021). Impact of organic manure on fruit set, fruit retention, yield, and nutritional status in pomegranate (*Punica granatum* L. “Wonderful”) under water and mineral fertilization deficits. *PeerJ*, 9, e10979. <https://doi.org/10.7717/peerj.10979>
- Adiba, A., Haddioui, A., Hamdani, A., et al. (2025). Impact of contrasting climate conditions on pomegranate development and productivity: Implications for breeding and cultivar selection in colder environments. *Vegetos*, 38, 528–541. <https://doi.org/10.1007/s42535-023-00771-6>
- Adiba, A., Radouane, N., Boudad, H., et al. (2025). Impact of thermal conditions on pomegranate (*Punica granatum* L.) biochemical traits: A comparative study of genotypic responses under contrasting climates. *Vegetos*, 38, 2022–2034. <https://doi.org/10.1007/s42535-024-01002-2>
- Ahmed, M. F., Ali, R. M., Saad, Z. H., et al. (2024). Ecofriendly treatments to improve pomegranate trees production and tolerance to climate change. *CABI Agriculture and Bioscience*, 5, 71. <https://doi.org/10.1186/s43170-024-00260-z>
- Ain, H. B. U., Tufail, T., Bashir, S., Ijaz, N., Hussain, M., Ikram, A., Farooq, M. A., & Saewan, S. A. (2023). Nutritional importance and industrial uses of pomegranate peel: A critical review. *Food Science & Nutrition*, 11, 2589–2598. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3320>
- Al-Saif, A. M., Mosa, W. F. A., Saleh, A. A., Ali, M. M., Sas-Paszt, L., Abada, H. S., & Abdel-Sattar, M. (2022). Yield and fruit quality response of pomegranate (*Punica granatum*) to foliar spray of potassium, calcium, and kaolin. *Horticulturae*, 8(10), 946. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100946>
- Azizpanah, A., Salavrzi Zadeh, M., Abed, A. K., & Taki, M. (2025). Eco-friendly pomegranate production: Balancing energy consumption and environmental impact. *PLOS ONE*, 20(8), e0329204. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329204>
- Babu, K. D., Singh, N. V., Gaikwad, N., Maity, A., Suryavanshi, S. K., & Pal, R. K. (2017). Determination of maturity indices for harvesting of pomegranate (*Punica granatum*).

- Indian Journal of Agricultural Sciences*, 87(9), 1225–1230. <https://doi.org/10.56093/ijas.v87i9.74209>
- Bartual, J., Fernandez-Zamudio, M. A., & De-Miguel, M. D. (2015). Situation of the production, research and economics of the pomegranate industry in Spain. *Acta Horticulturae*, 1089, 45. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1089.45>
- Beelagi, R., Singh, V. P., Jat, R., Singh, P. K., Rai, R., Singh, A., Basile, B., Mataffo, A., Corrado, G., & Kumar, P. (2023). Enhancing the fruit yield and quality in pomegranate: Insights into drip irrigation and mulching strategies. *Plants*, 12(18), 3241. <https://doi.org/10.3390/plants12183241>
- Boussaa, F., Zaouay, F., Burlo-Carbonell, F., Nuncio-Jáuregui, N., Gmati, M., El Arbi, B., Melgarejo, P., Hernández, F., & Mars, M. (2019). Combined effects of cropping system and harvest date determine quality and nutritional value of pomegranate fruits (*Punica granatum* L. cv. Gabsi). *Scientia Horticulturae*, 249, 419–431. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.02.007>
- Chandana, M. R., Gayatri, B. K., Ali, A., Anusha, C., Kumar, S. N., & Vittal, H. (2024). Challenges in pomegranate production: A review. *Madras Agricultural Journal*, 110(10–12), 124–130. <https://doi.org/10.29321/MAJ.10.201097>
- Coronado-Reyes, J. A., Tinoco-Salazar, J., Guisa-Morales, M. L., Cortés-Penagos, C. D. J., & González-Hernández, J. C. (2021). Morphology of Mexican pomegranate fruit (*Punica granatum*) varieties and their ripening stage. *Food Science and Technology*, 41, 993–999. <https://doi.org/10.1590/fst.28620>
- Day, K. R., & Wilkins, E. D. (2011). Commercial pomegranate (*Punica granatum* L.) production in California. *Acta Horticulturae*, 890, 39. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.890.39>
- Dewangan, P., & Gupta, A. (2023). Studies on the seasonal occurrence and control of pomegranate (*Punica granatum*) insect pests, with a focus on fruit borer and thrips. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 11(5), 22–25. <https://doi.org/10.22271/j.ento.2023.v11.i5a.9226>
- Drogoudi, P., Pantelidis, G. E., & Vekiari, S. A. (2021). Physiological disorders and fruit quality attributes in pomegranate: Effects of meteorological parameters, canopy position and acetylsalicylic acid foliar sprays. *Frontiers in Plant Science*, 12, 645547. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.645547>
- Elango, K., Sridharan, S., Vijayalakshmi, G., Arunkumar, P., & Suryaraj, R. (2021). Arthropod pests of pomegranate (*Punica granatum* L.) and their management. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 9(?), 125–134. <https://doi.org/10.5958/0974-4576.2021.00020.7>
- El-Bolok, T. K., El-Soda, A. S., & El Barbary, M. G. (2023). Impact of pruning and training systems on the growth and productivity of pomegranate trees. *Horticulture research journal*, 1(2), 197-207
- Galindo, A., Rodríguez, P., Collado-González, J., Cruz, Z. N., Torrecillas, E., Ondoño, S., Corell, M., Moriana, A., & Torrecillas, A. (2014). Rainfall intensifies fruit peel cracking in water-stressed pomegranate trees. *Agricultural and Forest Meteorology*, 194, 29–35. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2014.03.015>
- García-Pastor, M. E., Zapata, P. J., Castillo, S., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Valero, D., & Serrano, M. (2020). The effects of salicylic acid and its derivatives on increasing pomegranate fruit quality and bioactive compounds at harvest and during storage. *Frontiers in Plant Science*, 11, 668. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00668>
- Ghasemi-Soloklui, A.A., Kordrostami, M. & Gharaghani, A. Environmental and geographical conditions influence color, physical properties, and physiochemical composition of pomegranate fruits. *Sci Rep* 13, 15447 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42749-z>

- Ghatul, I. D., Jagtap, V. S., Padekar, V. D., & Ghorpade, S. B. (2019). Effect of different levels of pruning on quality of pomegranate (*Punica granatum* L.) cv. Super Bhagwa. *International Journal of Chemical Studies*, 7(5), 2899–2902.
- Guan, S., Chai, Y., Hao, Q., Ma, Y., Wan, W., Liu, H., & Diao, M. (2023). Transcriptomic and physiological analysis reveals crucial biological pathways associated with low-temperature stress in Tunisian soft-seed pomegranate (*Punica granatum* L.). *Journal of Plant Interactions*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/17429145.2022.2152887>
- Guliev, F., & Huseinova, L. (2020). Symptoms of the main diseases of *Punica granatum* L. in the conditions of Western Azerbaijan. *Agroecological Journal*, 4, 87–94. <https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219448>
- Hassan, I. F., Ajaj, R., Abd El-Khalek, A. F., Alam-Eldein, S. M., Gaballah, M. S., Athar, H. R., & Hatterman-Valenti, H. M. (2025). Effects of deficit irrigation on growth, yield, and quality of pomegranate (*Punica granatum*) grown in semi-arid conditions. *Horticulturae*, 11(1), 101. <https://doi.org/10.3390/horticulturae11010101>
- Jain, K., & Desai, N. (2018). Pomegranate the cash crop of India: A comprehensive review on agricultural practices and diseases. *International Journal of Health Sciences and Research*, 8(5), 315–321.
- Jena, G. G., Nangare, D. D., Kakade, V. D., Morade, A., Jadhav, S., Chavan, S., Pradhan, A., Rajagopal, V., & Reddy, K. S. (2025). Effects of deficit irrigation and growth regulators on physio-biochemical changes, yield, fruit quality and water productivity in pomegranate (*Punica granatum*) growing in shallow basaltic soils. *Irrigation and Drainage*. <https://doi.org/10.1002/ird.70044>
- Joshi, M., Schmilovitch, Z. E., & Ginzberg, I. (2021). Pomegranate fruit growth and skin characteristics in hot and dry climate. *Frontiers in Plant Science*, 12, 725479. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.725479>
- Kumar, G., Sharma, D. D., Kuchay, M. A., Kumar, R., Singh, G., & Kaushal, B. (2020). Effect of foliar application of nutrients on growth, yield and fruit quality of pomegranate (*Punica granatum* L.) cv. Bhagwa. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 39(20), 50–57. <https://doi.org/10.9734/cjast/2020/v39i2030807>
- Lokure, S., Somasekhara, Y. M., & Ravichandra, G. K. (2024). Morpho-molecular and management of pomegranate (*Punica granatum* L.) wilt caused by *Ceratocystis fimbriata* Ellis and Halst. *Journal of Scientific Research and Reports*, 30(8), 1–19. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2024/v30i82220>
- Marathe, R. A., Sharma, J. Y. O. T. S. A. N. A., & Babu, K. D. (2016). Identification of suitable soils for cultivation of pomegranate (*Punica granatum*) cv Ganesh. *Indian J. Agric. Sci*, 86, 227-233.
- Meshram, D. T., Gorantiwar, S. D., & Wadne, S. S. (2019). Crop coefficient and evapotranspiration of pomegranate (*Punica granatum* L.) for western part of Maharashtra, India. *Acta Scientific Agriculture*, 3(7). <https://www.actascientific.com/ASAG-03-0769.php>
- Mincuzzi, A., Sanzani, S. M., Palou, L., Ragni, M., & Ippolito, A. (2022). Postharvest rot of pomegranate fruit in southern Italy: Characterization of the main pathogens. *Journal of Fungi*, 8(5), 475. <https://doi.org/10.3390/jof8050475>
- Moradi, S., Zamani, Z., Fatahi, R. et al. Shading net and foliar applications of Si and K alleviates heat stress and improves pomegranate fruit quality. *Sci Rep* 15, 38564 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-22501-5>
- Mousa, M. A., Al-Qurashi, A. D., Ibrahim, O. H., Abo-Elyousr, K. A., Aal, A. M. A., El-Salhy, A. F. M., ... Abou-Zaid, E. A. (2025). Impact of irrigation regimes on growth and postharvest quality of pomegranates (*Punica granatum* L.) under conditions of newly reclaimed land. *HortScience*, 60(2), 172–181. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI18280-24>

- Munhuweyi, K., Lennox, C. L., Meitz-Hopkins, J. C., Caleb, O. J., & Opara, U. L. (2016). Major diseases of pomegranate (*Punica granatum* L.), their causes and management—A review. *Scientia Horticulturae*, 211, 126–139. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.08.029>
- Muradoğlu, F., Güler, E., Akkuş, G., Başak, İ., & Fawole, O. A. (2024). Pomegranate's (*Punica granatum* L.) fruit quality and nutrient content are influenced by soil fraction × root architecture interaction. *Annals of Applied Biology*. <https://doi.org/10.1111/aab.12889>
- Narjesi, V., Bonyanpour, A., & Ghasemi-Soloklui, A. A. (2025). Determining the optimal harvest time for pomegranate variety Wonderful in semi-arid climate. *Scientific Reports*, 15, 7668. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92015-7>
- Okba, S. K., Mazrou, Y., Mikhael, G. B., Farag, M. E. H., & Alam-Eldein, S. M. (2022). Magnetized water and proline to boost the growth, productivity and fruit quality of 'Taifi' pomegranate subjected to deficit irrigation in saline clay soils of semi-arid Egypt. *Horticulturae*, 8(7), 564. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8070564>
- Opara, I. K., Fawole, O. A., Kelly, C., & Opara, U. L. (2021). Quantification of on-farm pomegranate fruit postharvest losses and waste, and implications on sustainability indicators: South African case study. *Sustainability*, 13(9), 5168. <https://doi.org/10.3390/su13095168>
- Pawar, D., & Dingre, S. (2020). Productivity, water use, quality and economics of pomegranate fertigation in semiarid conditions of India. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 9(6), 2503–2510. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2020.906.304>
- Porrás-Jorge, R., Aguilar, J. M., Baixauli, C., Bartual, J., Pascual, B., & Pascual-Seva, N. (2025). Effect of deficit irrigation on agronomic and physiological performance of pomegranate (*Punica granatum* L.). *Plants*, 14(2), 164. <https://doi.org/10.3390/plants14020164>
- Raja, Gururaj, S., & Amaresh, Y. S. (2023). Bio-intensive disease management strategy as a way to control pomegranate wilt caused by *Ceratocystis fimbriata* Ell. and Halst. *International Journal of Environment and Climate Change*, 13(10), 2596–2609. <https://doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i102926>
- Rashmi, M. A., Sreedevi, K., Verghes, A., & Raghavendra, V. G. (2024). Potential yield losses caused by the adults of *Schizonycha ruficollis* on pomegranate (*Punica granatum*) flowers. *The Indian Journal of Agricultural Sciences*, 94(4), 437–439. <https://doi.org/10.56093/ijas.v94i4.143861>
- Sajjadullah, N. C., Sharma, N. C., Chauhan, P., Singh, G., & Sharma, U. (2022). Biostimulants as eco-friendly inputs for improving yield, fruit quality and orchard soil properties of pomegranate (*Punica granatum* L.). <https://doi.org/10.23910/1.2022.2842>
- Şimşek, M. (2017). A general overview of pomegranate (*Punica granatum* L.) production potential, effects to health, problems and solution proposals of Turkey. *Middle East Journal of Science*, 3(1), 51–58. <https://doi.org/10.23884/mejs.2017.3.1.06>
- Singh, A., Kumar, P., Meghwal, P. R., Santra, P., Naorem, A., & Khapte, P. S. (2024). Enhancing the fruit yield and quality of pomegranate in a new niche area: Insights into site specific agronomic practices. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 52(3), 13754–13754. <https://doi.org/10.15835/nbha52313754>
- Singh, A., Shukla, A. K., & Meghwal, P. R. (2020). Fruit cracking in pomegranate: extent, cause, and management—A Review. *International Journal of Fruit Science*, 20(sup3), S1234–S1253. <https://doi.org/10.1080/15538362.2020.1784074>
- Sonawane, M. S. (2017). Recent advances in the production of pomegranate fruit crop. *Agriculture Update*, 12(4), 657–665. <https://doi.org/10.15740/HAS/AU/12.4/657-665>
- Soni, M. L., BIRBAL, V., SAXENA, A., YADAVA, N., SuBBuLAKSHMI, V., & NATHAWA, N. S. (2020). Yield, water productivity and economics of legume based agri-horti systems during establishment phase of pomegranate (*Punica granatum*) in hyper arid partially

- irrigated zone of western Rajasthan. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 90(8), 1482-7.
- Tanari, N., Ramegowda, S., Thottan, A., & Girigowda, M. (2019). Effect of fertigation of primary nutrients on pomegranate (*Punica granatum* L.) fruit productivity and quality. *Tropical Plant Research*, 6(3), 424-432. <https://doi.org/10.22271/tpr.2019.v6.i3.052>
- Tarantino, A., Disciglio, G., Frabboni, L., & Lopriore, G. (2023). Organo mineral fertilizers increases vegetative growth and yield and quality parameters of pomegranate cv. Wonderful fruits. *Horticulturae*, 9(2), 164. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9020164>
- Tyagi, S. K., & Tiwari, A. (2017). *Pomegranate: Production, postharvest, marketing & export*. New India Publishing Agency.
- Tyagi, S. K., Khire, A. R., & Kulmi, G. S. (2021). Effect of integrated pest management module against major sucking pests of pomegranate (*Punica granatum* L.). *International Journal of Agricultural Sciences*, 17, 191–193. <https://doi.org/10.15740/HAS/IJAS/17-AAEBSSD/191-193>
- Vadivel, R., Reddy, K. S., Singh, Y., & Nangare, D. D. (2024). Effect of pit and soil types on growth and development, nutrient content and fruit quality of pomegranate in the central Deccan plateau region, India. *Sustainability*, 16(18), 8099. <https://doi.org/10.3390/su16188099>
- Venkitasamy, C., Zhao, L., Zhang, R., & Pan, Z. (2019). Pomegranate. In *Integrated processing technologies for food and agricultural by-products* (pp. 181-216). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814138-0.00008-3>
- Volschenk, T. (2021). Effect of water deficits on pomegranate tree performance and fruit quality—a review. *Agricultural Water Management*, 246, 106499. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106499>

Pomegranate Production and Yield-Affecting Factors: A Review

Nawab Nasir^{1*}, Najeebullah Mujadidi¹

¹Department of Horticulture, Faculty of Plant Sciences, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: nasir.redtomato@gmail.com

Abstract

Pomegranate is an important economic and nutritional fruit widely cultivated in semi-arid and arid regions. Despite its adaptability to diverse environmental conditions, its yield varies significantly across different locations due to several influencing factors. This review highlights the major factors affecting pomegranate yield, including climatic conditions, soil properties, water management, agronomic practices, and biotic stresses such as pests and diseases. Climatic factors such as temperature fluctuations, drought, rainfall, relative humidity, and solar radiation have profound effects on fruit development, physiology, and yield. Soil fertility, salinity, and irrigation methods significantly influence nutrient uptake, plant growth, and productivity. Moreover, modern agronomic practices such as drip irrigation, fertigation, pruning, and balanced nutrition play a crucial role in improving yield and fruit quality; however, improper management can lead to considerable losses. Biotic stresses, including major diseases such as bacterial blight and anthracnose, as well as pests like fruit borers and aphids, can reduce yield by up to 95% in severe cases. Harvest timing is also a critical factor that determines fruit quality, storability, and marketability, as delayed harvesting may lead to fruit cracking and yield losses. In conclusion, the yield and quality of pomegranate are influenced by climatic, soil-related, managerial, and biological factors, and the proper management of these factors is essential for achieving high and sustainable production.

Keywords: Biotic Stresses, Climatic Factors, Fruit Quality, Pomegranate, Production

د زمزم اوبو ترکيب، هايډرولوژي او روغتيايي گټې: مروري څېړنه

ليکوالان: Boshra et al., 2021

ژباړن: محمد يعقوب سرفراز¹

¹کيميا خانگه، د ښوونې او روزنې پوهنځی، کندهار پوهنتون، کندهار، افغانستان

د ژباړن ليکوال ایمیل ادرس: myaqqoobsarfraz@gmail.com

لنډيز

د زمزم اوبه له زرگونو کالونو راهيسې د گڼو دينونو د پيروانو له خوا د درملنې او روحاني مراسمو لپاره کارول شوې دي. په دې څېړنه کې د زمزم اوبو کيمياوي ترکيب، هايډرولوژي (اوبو پېژندنه) او په روغتيايي اړخونو يې اغېزې ارزول شوې دي. څېړنې ښيي، چې زمزم اوبه د معمولي څاه گانو يا نل له اوبو سره توپير لري. دغه اوبه د منرالي موادو له امله قلوي خاصيت لري، له بيولوژيکي پلوه پاکې دي، هېڅ ډول مايکروبي وده پکې صورت نه نيسي او زهرجن خاصيت نه لري. د زمزم څاه د مکې مکرمې په غونډيو کې موقعيت لري او له شاوخوا 4000 کلونو راهيسې ورڅخه گټه اخيستل کېږي. دا اوبه د مختلفو ناروغيو په درملنه کې گټورې بلل کېږي. په دې مقاله کې د زمزم اوبو ترکيب، هايډرولوژي او روغتيايي گټې په تفصيل سره ارزول شوې دي. سره له دې، لا هم نورو څېړنو ته اړتيا شته، تر څو د زمزم اوبو نورو احتمالي گټو، لکه انټي اکسيدانتي خاصيت، د ميکروب ضد اغېزو او د سرطان پر وړاندې د ممکنه خونديتوب په اړه لا ډېر معلومات تر لاسه شي.

کلیدي کليمې: انټي اکسيدانت، روحاني مراسم، زمزم اوبه، ميکروب ضد

سریزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله واصحابه اجمعين.

د انساني ټولني لپاره اوبه له دوو اصلي سرچينو تأمينېږي: د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه. د ځمکې د مخ اوبه هغه دي، چې د ځمکې پر سطحه موجودې وي، لکه ويالي، سيندونه، جهيلونه، سمندرونه او نور. تر ځمکې لاندې اوبه هغو اوبو ته ويل کېږي، چې د ځمکې تر سطحې لاندې د شگو، جغل يا ماتو شويو ډبرو (لکه چوني ډبرې) له نفوذي طبقو څخه تېرېږي. دغه ډبرې او مواد خاليگاوي او سوري لري، چې اوبو ته د تېرېدو لاره برابروي. د دې اوبو د جريان سرعت د يادو خاليگاوو او سوريو په جسامت او قطر پورې اړه لري (Bethke & Johnson, 2008).

اوبه د ټولو ژونديو موجوداتو (له ابتدايي ژويو نيولې تر انسان پورې) لپاره د ژوند اساسي اړتيا ده. اوبه په بدن کې د محلل (Solvent) او لېږدوونکې (Carrier) په توگه عمل کوي، ويتامينونه او نور ضروري مغذي مواد حل کوي او حجرو ته يې انتقالوي. که څه هم ژوندي موجودات د اوبو د اړتيا له نظره يو له بل سره توپير لري (مثلاً باکتریاوې کمو اوبو ته اړتيا لري)، خو هېڅ ژوندي موجود له اوبو پرته ژوند نه شي کولای. کېدای شي انسان له خوړو پرته تر 30 ورځو پورې ژوندي پاتې شي، خو له اوبو پرته يوازې تر 7 ورځو پورې ژوندي پاتې کېدای شي. اوبه داسې ماده ده، چې د گڼو عضوي مرکبونو د حل کولو توان لري او همدا ځانگړتياوې د دې لامل شوې دي چې د ځمکې پر مخ د ژوند لومړنۍ نښې راپيدا شي. سربېره پردې، اوبه د لمر د مستقيمو وړانگو پر وړاندې د ځمکې د تودوخې د تنظيم په برخه کې مهم رول لري. اوبه د نباتاتو د ژوند د دوام لپاره هم حياتي ارزښت لري، لکه هغه نباتات، چې په باغونو او پارکونو کې کرل کېږي. اوبه د بېلابېلو کرنيزو محصولاتو د توليد لپاره ضروري دي او همدارنگه د گڼو صنعتي توکو د جوړولو لپاره هم بنسټيزه اړتيا بلل کېږي. په همدې لړ کې، زمزم اوبه د طبيعي قلوي (Alkaline) اوبو له ډلې څخه دي، چې د بدن لپاره مهمې معدني مالگې لري، د انرژي په زياتولو کې مرسته کوي او د بدن د pH کچه متوازنه ساتي، چې له همدې امله د ناروغيو د مخنيوي توان هم لري. دغه اوبه د قوي انټي اکسیدانتي اغېزو له امله هم مشهوره دي (Shomar, 2012).

د زمزم څاه په مکه مکرمه (سعودي عربستان) کې موقعيت لري او دا اوبه تر مصرف مخکې د مايکرو فلترېشن په واسطه تصفيه کېږي او بيا د ماوراءبنفش (UV) وړانگو په مرسته تعقيمېږي. مايکروبيولوژيکي څېړنو ښودلې، چې له دې څاه څخه اخيستل شوې اوبه هېڅ ډول ميکروبي وده نه لري او له دې امله زمزم اوبه پاکې، تعقيم شوې او له ناروغيو څخه خوندي گڼل کېږي (Kufiyah et al., 2021).

شاليد

له پخوا زمانو راهيسې د مختلفو دينونو پيروانو زمزم اوبه د درملنې او روحاني مراسمو لپاره کارولې دي. په ځانگړي ډول، مور مسلمانان باور لرو، چې زمزم اوبه مقدسې، برکت ناکې او د الله تعالی له لوري ځانگړې شوې دي، داسې چې د لوړې او تندي ختمولو تر څنگ، ناروغانو ته هم شفا ورکوي. حاجيان صاحبان هڅه

کوي، چې له حج څخه د راستنېدو پر مهال دا اوبه له ځانونو سره خپلو سيمو او کورونو ته يوسي. سربېره پردې، هغه کسان چې زمزم څاه ته نږدې اوسي، دا اوبه په دوامداره توگه کاروي (Shomar, 2012). زمزم اوبه له نورو تصفيه يا د بوتل له اوبو سره څرگند توپير لري. دا اوبه ځانگړې نوري (Optical) ځانگړتياوې لري او د منرالي ترکيب له مخې هم له عامو اوبو څخه متفاوتې دي. هر کال ميليونونه حاجيان صاحبان د حج په مراسمو کې زمزم اوبه څښي او د مذهبي، روحاني او درمليزو موخو لپاره يې هم خپلو هېوادونو ته وړي. زمور مسلمانانو له نظره، دغه اوبه نه يوازې خونديتوب لري، بلکې معنوي ارزښت يې هم د عقيدې يو مهم اړخ گڼل کېږي (Shomar, 2012).

د زمزم اوبو سرچينه

د زمزم څاه د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې، د کعبې شريفې ختيځ لوري ته 21 m ليرې موقعيت لري. دا څاه چې په 1 شکل کې ليدل کېږي، د انسانانو په لاس کيندل شوي ده او ژوروالي يې شاوخوا 30.5 m او قطر يې له 1.08 m څخه تر 2.66 m پورې رسېږي (Ahmad et al., 2018). د عربو تاريخپوهانو په وينا، د زمزم څاه تقريباً 4000 کاله وړاندې فعال شوی او تر نن ورځ پورې بغير له کومې وقفې گټه ورڅخه اخيستل کېږي. د اسلامي عقيدې له مخې، دا څاه د الله تعالی د رحمت نښه ده. روايتونه وايي، چې کله حضرت هاجر، د حضرت ابراهيم عليه السلام مېرمن، له خپل زوی حضرت اسماعيل عليه السلام سره د سختې تندې له امله د اوبو په لټه کې وه، نو الله جل جلاله جبرائيل عليه السلام راولېږه، چې د ځمکې خاوره وڅنډي او له هغه ځايه د اوبو يوه چينه راوتوکېږي. د اوبو له بهېدلو سره، حضرت هاجرې، د هغې چاپېره د شگو او ډبرو يو کاسه نما ديوال جوړ کړ، ترڅو اوبه مهار او کنترول کړي (Al-Zuhair & Khounganian, 2006). د صحيح البخاري روايتونه څرگندوي، که حضرت هاجرې دا چينه نه وای مهار کړې، نو بنايي دا اوبه به د ځمکې پر مخ يوه بهېدونکې وياله گرځېدلې وای. مور مسلمانان باور لرو، چې دا الهي چينه د حضرت اسماعيل عليه السلام د لورې، تندې او ژړا پر مهال را څرگنده شوې ده. ځينې روايتونه دا هم وايي چې حضرت اسماعيل عليه السلام د ځمکې پر مخ پښې ووهلې او د همدې ځای نه د زمزم اوبه راوتوکېږي (Shomar, 2012).



1- شکل: د زمزم تاريخي څاه خوله (د اوبو رايستلو ځای)

د زمزم څاه موقعیت او هایدرولوجیولوژیکي ځانګړتیاوې

د هایدرولوجیولوژیکي ارزونې له مخې، د زمزم څاه د ابراهیم درې (وادي ابراهیم) په لمن کې موقعیت لري، چې یادې درې د مکې مکرمې ښار احاطه کړې دی. دغه دره تر ځمکې لاندې اوبه له خاورینو طبقو څخه ژورو طبقو ته انتقالوي. د څاه پورتنۍ 13.5 m برخه د وادي ابراهیم په شگلنه طبقه (Sandy Alluvium) کې موقعیت لري او لاندینۍ 17 m برخه یې د ډیورایت (Diorite) ډبرو په ساحه کې کېندل شوې ده. د دې دوو طبقو تر منځ نرۍ، شاوخوا 0.5 m ضخامت لرونکې طبقه شتون لري چې له مسامداره (سوري لرونکو) ډبرو څخه جوړه شوې ده. دا طبقه د اوبو د جریان اصلي مسیر ګڼل کېږي. د زمزم څاه دیوالونه په عمومي ډول له طبیعي ډبرو جوړ شوي دي، خو تر ټولو پورتنۍ یو متره برخه یې د فلزي یا کانکرېتي حلقې په بڼه کلک جوړښت لري (Khalid et al., 2014).

تاریخي اسناد ښيي، چې د زمزم څاه د انسانانو په واسطه په لاس کېندل شوې، چې ژوروالی یې 30.5 m او قطر یې له 1.08 څخه تر 2.66 m پورې دی. اوس مهال د زمزم څاه د مسجد الحرام په یوه زېر زميني خونه (Basement Room) کې موقعیت لري، چې د شفافو ښیښه یي دیوالونو په واسطه احاطه شوې ده، تر څو زیارت کوونکي وکولای شي، دا مبارک څاه له بهر څخه وويني (Ahmad, 2018).

پخوا به خلکو د رسبو او ډولچو په مرسته له څاه څخه اوبه رااېستلې، خو اوس د ټکنالوژي له پرمختګ سره، د اوبو د استخراج لپاره برقي پمپونه کارول کېږي. اوسمهال زائرینو (زیارت کوونکو) ته د دې اجازه نه ورکول کېږي، چې د زمزم څاه خونې ته داخل شي، خو د مسجد الحرام په شاوخوا کې د زمزم یخو اوبو لپاره ځانګړي نلونه او نور وېشونکي وسایل ځای پر ځای شوي دي، تر څو زیارت کوونکي اسانه لاسرسی ورته ولري او له دې مبارکو اوبو څخه د څښلو او ځان سره وړلو لپاره ګټه واخلي. د مسجد الحرام د وروستیو پراختیاوو پر مهال، د زمزم څاه ساحه پوښل شوې او د خلکو په وړاندې بنده شوې ده (Saudi Geological Survey, 2016).

د نورو اوبو په پرتله د زمزم اوبو کیفی ځانګړتیاوې

فزیکي ځانګړتیاوې

زمزم اوبه داسې ځانګړتیاوې لري، چې دا څاه یې له نورو طبیعي ځاګانو څخه کاملاً جلا او ځانګړې کړې ده. د تاریخ په اوږدو کې، د زمزم څاه هېڅکله نه ده ککړه سوې او تر ننه پورې هر هغه څوک چې د مکې مکرمې سپېڅلي جومات ته ورځي، له دې اوبو ګټه اخلي. دا اوبه نه یوازې دوامداره دي، بلکې دومره ډېرې دي، چې د میلیونونو زائرینو اړتیاوې پوره کولای شي. علمي مشاهدو څرګنده کړې، چې د حج په دوران کې، په ځانګړي ډول د ذوالحجې په اوومه نېټه د څو پرله پسې کلونو لپاره، له زمزم څاه څخه په هر ساعت کې نږدې $10,000 \text{ m}^3$ اوبه رااېستل شوې دي، خو بیا هم لا د اوبو سطحه ثابته پاتې شوې ده. یو له مهمو ځانګړنو څخه یې دا ده، چې دا اوبه د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه د میلیونونو خلکو لخوا په دوامداره ډول کارول شوې دي، خو تر اوسه هېڅ ډول روغتیايي شکایت یا منفي اغېزه نه ده ثبت شوې. برعکس، دا اوبه تل د پاکوالي، خونديتوب او درملیزو

گټو له امله ستايل شوي دي. همداراز، د نورو ځاگانو په پرتله، په زمزم څاه کې هېڅ ډول بيولوژيکي وده نه ده ليدل شوې، لکه د الجي، باکټرياوو يا نورو مايکرو ارگانيزمونو شتون. دا ځانگړتيا بڼي چې زمزم اوبه نه يوازې فزيکي خونديتوب لري، بلکې له مايکروبيولوژيکي پلوه هم په استثنايي ډول پاکې دي (Shomar, 2012).

د زمزم اوبه د کيمياوي ترکيب له مخې له نورو اوبو څخه جلا ځانگړتياوې لري. گڼ شمېر علمي څېړنو څرگنده کړې، چې ددې اوبو معدني مالگې په يو ليتر کې نږدې 2,000 mg دي، په داسې حال کې چې په تصفيه شويو معدني اوبو کې دغه اندازه يوازې له 150 تر 350 mg پورې ده او د عادي اوبو منځنۍ اندازه تقريباً 200 mg/L ده. زمزم اوبه نرمې هضمي اوبه گڼل کېږي، ځکه چې په هر ليتر کې 366 mg باي کاربونيټ شتون لري. په عادي اوبو کې هغه اوبه کاربونيټي گڼل کېږي چې د باي کاربونيټ کچه يې تر 357 mg/L لوړه وي. د باي کاربونيټ لوړوالی د اوبو د فلوي خاصيت ښکارندويي کوي، چې د هضم لپاره نرمې او گټورې گڼل کېږي. د معدني اوبو دا ډول ترکيب د ډېرو ناروغيو په درملنه کې گټور گڼل کېږي او د بدن لپاره مهم معدني عناصر برابر وي، چې له امله يې زمزم اوبه د درملنې او روغتيا د پياوړتيا په برخه کې ځانگړی ارزښت لري (Alglobol, 2010).

زمزم اوبه له مقناطيسي شويو اوبو سره ورته ځانگړتياوې لري او څېړنې بڼي چې ممکن دغه اوبه له طبيعي مقناطيسي خاصيتونو برخمنې وي. دا ځانگړتيا بڼي د سختو او کلکو ډبرو له طبيعت سره تړاو ولري چې د زمزم څاه شاوخوا موقعيت لري، ځکه دغه سيمه د کلکو ډبرو درلودونکې ده. له فزيکي او کيمياوي اړخه، د اوبو ماليکولونه دوه اټومه هايډروجن او يو اټوم اکسيجن لري، چې د کووالانسي اړيکو (Covalent Bonds) په مرسته يو له بل سره تړل شوي دي. په عادي اوبو کې د هايډروجن او اکسيجن اټومونو ترمنځ رابطوي زاويه 104° ده، خو په زمزم اوبو کې دغه زاويه په ځانگړي ترتيب سره تنظيم شوې، چې له همدې امله د زمزم اوبو فزيکي ځانگړتياوې له نورو مقناطيسي شويو اوبو څخه غوره گڼل کېږي. تر ټولو مهمه ځانگړتيا دا ده چې زمزم اوبه داسې ځانگړي نوري (Optical) خواص لري چې د نورو اوبو په څېر د مقناطيسي کېدو له لارې نه تقليديږي. يعنې دا اوبه د نوري مايع (Optical Fluid) په توگه کارول کېدای شي، ځکه چې ځانگړي نوري خاصيتونه لري (Alglobol, 2010).

جاپاني ساينس پوه، ډاکټر ماسارو ايموتو، د نانو ټکنالوژي په مرسته څرگنده کړې ده، چې زمزم اوبه ځانگړې علمي ځانگړتياوې لري چې په عادي اوبو کې نه ليدل کېږي. ايموتو وموندله چې هېڅ ډول ټکنالوژي نه شي کولای، د زمزم اوبو اصلي ځانگړتياوې بدلې کړي. حيرانوونکې پايله دا وه، چې که د عادي اوبو په زرگونو څاخکو کې يو څاخکی زمزم اوبه گډې شي، نو عادي اوبه هم د زمزم اوبو ځانگړتياوې خپلوي. ايموتو څرگنده کړه، چې د زمزم اوبو کرسټلونه د نړۍ د نورو اوبو له کرسټلونو سره توپير لري. کله چې پر دغو اوبو باندې د بسم الله الرحمن الرحيم يا د قرآن کریم نور مبارک ايتونه تلاوت شي، نو کرسټلونه يې په بې ساري توگه ښايسته او د منظمو هندسي شکلونو په بڼه راڅرگنديږي. دغه هندسي جوړښتونه ممکن د قرآن کریم د تلاوت له

اهتزازونو څخه د رامنځ ته شوې انرژي انعکاس وي، چې د زمزم اوبو په کرسټونو کې ښکلی او ارام حالت جوړوي (Emoto, 2005). یاد جاپاني ساینسپوه (ایموتو) د زمزم اوبو بڼې ثبت کړې او یوه ځانگړې تخنیک ته یې وده ورکړه، چې د یوه ځواکمن مایکروسکوپ په مرسته یې، په یخه خونه کې د یخو شویو اوبو د نمونو اړوند د نیو جوړو شویو کرسټونو تصویرونه اخیستل. هغه څرگنده کړه چې د تعامل په جریان کې د مالیکولونو ترمنځ اړیکې کنټرولول، دا مالیکولونه د ځانگړو موادو د تولید له لارې هدایتول، یوه ځانگړې غبرگون ته لاره هواروي، چې د مالیکولي جوړښت (Molecular Fabrication) په نوم یادېږي. دا چاره تضمینوي چې اتومونه د کیمیاوي تعامل پر مهال په سم او مناسب ترتیب کې ځای پر ځای کېږي (Reville, 2016).

که څه هم زمزم اوبه د اوبو په نوم یادېږي، خو له نورو اوبو سره یې اساسي توپیر شته، ځکه نورې اوبه تېزابي خاصیت دي، خو زمزم اوبه قلوي (Alkaline) خاصیت لري. دوامداره څښل یې بدن ته د وایروسونو پر وړاندې قوي معافیت ورکوي، ځکه وایروسونه په القلي چاپیریال کې ژوند نه شي کولای. له همدې امله حاجیان هڅه کوي چې د حج په موسم کې زیاتې زمزم اوبه وڅښي تر څو د انتاني ناروغیو مخه ونیسي. د گڼو کیمیاوي څېړنو پایلې ښيي، چې زمزم اوبه لوړ مقدار کلسیم (Ca)، مگنیزیم (Mg) او نور مهم معدني عناصر لري. په نورو اوبو کې د معدني مالگو اندازه له 130 څخه تر 160 mg/L وي، خو په زمزم اوبو کې دا اندازه تر 2000 mg/L پورې رسېږي. له همدې امله زمزم اوبه د سترو او خسته حاجیانو صاحبانو لپاره تازه کوونکې او ځواک بخښونکې وي (Shomar, 2012).

کیمیاوي ځانگړتیاوې

شومار او همکارانو یې د زمزم اوبو 30 نمونې د څلورو مختلفو وسایلو (ICP-MS, ICP-OES, IC) او HGAAS په مرسته وڅېړلې. د دې څېړنو پایلې ښيي چې د 24 میاشتو په اوږدو کې د زمزم اوبو کیفیت ثابت پاتې شوی دی او د دې اوبو د pH منځنۍ کچه شاوخوا 8 ده، چې د قلوي خاصیت ښکارندويي کوي (Shomar, 2012). په زمزم اوبو کې د نایتریت (NO_3^-) اندازه د روغتیا نړیوال سازمان د معیارونو په پرتله درې چنده لوړه ثبت شوې ده. د کلسیم او پوتاشیم منځنۍ کچې په ترتیب سره 95 mg/L او 50 mg/L دي، چې د بدن لپاره مهم عناصر گڼل کېږي. همداراز د یوې بلې پراخې څېړنې په ترڅ کې د زمزم اوبو د 34 بېلابېلو عناصرو کچه اندازه شوې ده او څرگندوي چې په زمزم اوبو کې کلسیم (Ca)، مگنیزیم (Mg)، سوډیم (Na) او کلورین (Cl) تر طبیعي اوبو په لوړه کچه موجود وو. په مقابل کې، د انټیموني (Sb)، بیرلیم (Be)، بیسموت (Bi)، برومین (Br)، کوبالت (Co)، ایوډین (I) او مولیبډینیم (Mo) کچې تر 0.01ppm ټیټې وې. کرومیم (Cr)، منگانیز (Mn) او تیتانیوم (Ti) هم په لږ مقدار موندل شوي دي. زیان رسوونکي او زهرجن عناصر لکه ارسینیک (As)، کډمیم (Cd)، سیلینیم (Se) او سرب (Pb) په زمزم اوبو کې د څښاک وړ اوبو تر خطرناکې کچې ښکته وو، چې دا د زمزم اوبو د پاکوالي او خونديتوب ښکارندوی دي (Ahmad, 2018).

بيولوژيکي ځانگړتياوې

د زمزم اوبو تقاضا تل نړيواله پاتې شوې ده، ځکه چې دغه اوبه د نورو اوبو غوندې نه رنگ، نه خوند او نه هم بوی بدلوي. په عامو اوبو کې دا ډول بدلونونه زياتره وخت د الجيانو او شنو خزو (Moss) د ودې په نتيجه کې منځ ته راځي، چې امله يې د اوبو بوی او خوند خرابېږي، خو د تاريخ په اوږدو کې ثابته شوې ده، چې زمزم اوبه له دې ډول ستونزو څخه خوندي دي. ساينسي څېړنو ثابته کړې ده، چې په زمزم اوبو کې هيڅ ډول مايکروبي وده نه تر سترگو کېږي. دا اوبه، برعکس له عادي اوبو، نه کلورين شوې او نه هم د کيمياوي موادو په مرسته ساتل شوې دي. په طبيعي سرچينو لکه سيندونو، څاگانو او د اوبو په نورو زيرمو کې بيولوژيکي فعاليت او نباتات (فلورا) شتون لري، چې د اوبو خوند، بوی او کيفيت اغېزمنوي. خو زمزم څاه له دې قاعدې مستثنا دی، ځکه تر اوسه پورې پکې هيڅ ډول بيولوژيکي وده نه ده مشاهده شوې (Ahmad, 2018).

د نانو تکنالوژي پر بنسټ تر سره شوې څېړنې ښودلې ده، چې که يوازې يو څاڅکی زمزم اوبه له زرو څاڅکو عادي اوبو سره گډ شي، نو دا ټولې اوبه د زمزم اوبو ځانگړتياوې خپلوي (Ahmad, 2018; Mashat, 2010). Mashat په باور، زمزم اوبه له هر ډول ژوندي يا بيولوژيکي فعاليت څخه خالي دي. تجربو هم ښودلې چې د *E. Coli* باکتریا په وسيله د زمزم اوبه نه دي ککړې شوې او د ټولو اخیستل شويو نمونو بيولوژيکي کچه د منل شويو معيارونو د ننه پاتې شوې ده (Mashat, 2010).

مسلمانان له بېلابېلو هيوادونو او سيمو څخه د زمزم څاه ته ورځي، دا اوبه څښي، د شفا نيت کوي، اودس او غسل ورباندې ورباندې کوي. د دې عمل له امله لويه برخه اوبه بالاخره د فاضلاب سيستم ته داخلېږي. نو له همدې امله وړاندیز شوی، چې دا اوبه دې د کرنيزو موخو لپاره وکارول شي، لکه د تغذيوي او زياتي نباتاتو د آبياري لپاره، په ځانگړې توگه د مقدسو ځايونو لکه عرفات او منی په شاوخوا سيمو کې (Hamed et al., 2009).

د السوکارې له خوا په ترسره شوې څېړنه کې، د عدس پر نبات د زمزم اوبو اغېزې ارزول شوې دي. دا څېړنه ښيي چې د عدس د نهالونو د آبياري لپاره که زمزم اوبه په بېلابېلو اندازو وکارول شي، نو د تخم ټوکېدل ډېرېږي او د پروټين او RNA مقدار پکې لوړېږي. په ټوله کې، زمزم اوبه د مکې مکرمې په شاوخوا سيمو کې د نباتاتو د آبياري لپاره مثبتې اغېزې لري. پکې موجود تغذيوي عناصر نه يوازې د نبات وده پياوړې کوي، بلکې د ضرري موادو منفي اغېزې هم کموي (Alsokari, 2011).

د زمزم اوبو انټي اکسیدانتي فعاليت

په انسانانو او حيواناتو کې زياتره ناروغۍ د اکسیديټيف فشار (Oxidative Stress) له امله رامنځ ته کېږي، له همدې امله انټي اکسیدانټونه د روغتيا لپاره ډېر مهم گڼل کېږي (Pitocco et al., 2010). څېړنو ښودلې ده، چې د حيواناتو په بدن کې د انټي اکسیدانتي دفاع وړتيا د اوبو له لارې تقويه کېدای شي (Nassini et al., 2010). القلي اوبه، لکه د زمزم اوبه، له انټي اکسیدانتي پلوه ډېر اهميت لري، چې دا خاصيت يې د اوبو د القلي طبيعت

له امله دی. په یوه څېړنه کې د گاما وړانگو (Gamma Radiation) تر اغېزې لاندې، د مورکانو د هلوکوکو د مغز د حجرو د ساتنې لپاره د زمزم اوبو وړانگو ضد اغېزه (Anti-Radiation Effect) ارزول شوې ده. زمزم اوبه چې القلي خاصیت لري، د حجراتو د زهري (Cytotoxic) او کلاستوجینیک (Clastogenic) اغېزو کچه را کموي. دغه موندنه هغه نظر پیاوړی کوي چې طبیعي انټي اکسیدانت لرونکي مواد، لکه زمزم اوبه، د مصنوعي ساتونکو موادو په پرتله گټور وي او جانبي عوارض نه لري (Yazdi et al., 2017).

همداراز، Bamosa او همکارانو یې پر دویم ډول شکره (Type 2 Diabetes) لرونکو ناروغانو باندې د زمزم اوبو اغېزې ارزولې دي، ترڅو د دوی اکسیدانتي او انټي اکسیدانتي وضعیت، د وینې د قند کنترول او د وینې د چربي (Lipid Profile) بدلونونه تر ارزونې لاندې ونیسي. د دې څېړنې پایلو وښودله، چې د زمزم اوبو څښاک انټي اکسیدانتي ظرفیت یې په مؤثر ډول لوړ کړی او د ناروغانو روغتیا یې ښه کړې ده (Bamosa et al., 2013). همدارنگه د Al Meheithif Abdullah او همکارانو لخوا په ترسره شوې څېړنه کې زمزم اوبه د القلي اوبو په توگه د انټي اکسیدانت د میکانیزم له نظره ارزول شوې دي او څېړونکو د همدې موخې لپاره د مورکانو په دوو ډلو تجربې تر سره کړې دي. په لومړۍ ډله کې نورمال مورکان (د کنترول گروپ) وو او دوهمه ډله هغه مورکان وو، چې د جینتامایسین (Gentamicin) په نوم انټي بیوتیکو لوړ دوز ورکړل شوی و، چې دا درمل د اکسیدېتيف فشار او زهرجنو اغېزو سبب کېږي. دواړو ډلو ته د 21 ورځو لپاره زمزم اوبه ورکړل شوې. د څېړنې پایلو وښودله چې زمزم اوبو په نورمال مورکانو هېڅ زهرجنه نښه نه لرله او همداراز یې د هغو مورکانو انټي اکسیدانتي وضعیت هم ښه کړ چې د جینتامایسین له امله تر اکسیدېتيف فشار لاندې وو (Al Meheithif Abdullah et al., 2012).

د Abdelsalam Elnour او همکارانو لخوا په تر سره شوې څېړنه کې، زمزم اوبه د احتمالي انټي اکسیدانتي عامل په توگه څېړل شوې دي، ترڅو دا معلومه شي چې ایا دغه اوبه د کاربن تتراکلوراید (Carbon Tetrachloride) له امله رامنځ ته شوی د مورکانو د ځیگر زهریت (Liver Toxicity) راکمولی شي که نه. پایلو څرگنده کړه، چې زمزم اوبو د کاربن تترا کلوراید پر وړاندې د ځیگر محافظتي اغېزه لرله او د زهري اغېزو مخه یې په مؤثر ډول نیولې ده (Abdelsalam Elnour et al., 2013).

د زمزم اوبو میکروب ضد (Antimicrobial) فعالیت

مایکروارگانیزمونه، یا کوچني ژوندي موجودات، د انسانانو د ډېرو ساري ناروغیو اصلي لامل بلل کېږي. له دې ډلې، باکتریاوې لکه *E. Coli* او *Salmonella* د انسان د داخلي نرمو غړو د شدیدو ناروغیو او حتی د مړینې سبب کېږي، چې دا یوه جدي طبي ستونزه گڼل کېږي. همداراز، د فنگسي ناروغیو له ډلې *Candida albicans* فنگس دي، چې د مړینې او اوږدمهاله ناروغیو د زیاتوالي لامل گڼل کېږي. زمزم اوبه، هغه سپیڅلې اوبه دي چې میلیونونه مسلمانان یې څښي. دا اوبه مایکروبي ککړتیا، فنگس، پوپنک او الجي نه لري، چې معمولاً د اوبو د بوی، خوند او کیفیت د خرابېدو لامل کېږي. بېلابېلو علمي څېړنو ثابته کړې چې په زمزم اوبو

کې د مايکروارگانيزمونو وده نه تر سترگو کېږي او له همدې امله دا اوبه د څښاک لپاره خوندي، پاکې او باکفيته بلل کېږي (El-desoukey, 2013).

زموږ گران پيغمبر حضرت محمد صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي:

“د نړۍ تر ټولو غوره اوبه د زمزم اوبه دي؛ دا د خوړو يوه برخه ده او له ناروغيو شفا ورکوي [صحيح الجامع: 3322]” (El-desoukey, 2013).

زمزم اوبه ځانگړی کيمياوي ترکيب لري چې دا اوبه يې له نورو ممتازې کړې دي. د کلسيم او مگنيزيم په شان مهم معدني عناصر پکې په لوړه کچه موجود دي. همداراز، په يادو اوبو کې فلورايد موجود دی چې میکروب وژونکی خاصيت لري. فلورايد نه يوازې د مضرو مايکرو ارگانيزمونو، بلکې د الجي د ودې مخه هم نيسي، چې له امله يې زمزم اوبه خپل خوند او بوی نه بدلوي. د دې ټولو فکتورونو په نتيجه کې، زمزم اوبه داسې چاپېريال نه دی، چې پکې باکتریاوې يا فنگس وده وکړي. سربېره پردې، دا اوبه د طبيعي انټي اکسیدانتونو غوره سرچينه گڼل کېږي، چې د ډېرو ناروغيو او د هغوی د منفي اغېزو پر وړاندې دفاعي رول لوبوي (Ahmad et al., 2018; Khalid et al., 2014).

د زمزم اوبو سرطان ضد اغېزه (Anticancer Effect)

زمزم اوبه، چې القلي خاصيت لري او گڼ شمېر مهم منرالونه پکې شته، د سرطان ضد مؤثر طبيعي درمل بلل کېږي. په يوه څېړنه کې، د انسان د سږو په سرطاني حجرو (A549) باندې د زمزم اوبو سايتوتوکسيک (حجره وژونکي) اغېزه څېړل شوې ده او دا اغېزه د انسان د پوستکي د عادي فايبروبلاستونو (HSF) سره پرتله شوی دی. پایلو ښودلې ده، چې زمزم اوبو د A549 سرطان خپلو حجرو د ژوند وړتيا (Viability) په څرگند ډول راکمه کړې، چې دا د سږو د سرطان د درملنې لپاره د زمزم اوبو د احتمالي اغېزمنتيا څرگندونه کوي (Omar et al., 2017).

همدارنگه، يو شمېر نورې څېړنې د مورکانو پر تجربوي ډلې ترسره شوې دي، چې په ترڅ کې يې هغوی ته د 30 ورځو لپاره هره ورځ 500 mL زمزم اوبه ورکړل شوې، ترڅو د کولمو د سرطان احتمالي درملنه وارزول شي (Khalid et al., 2014). د څېړنې پایلې ښيي، چې د تومور (سرطاني دانه) اندازه په څرگند ډول کمه شوې وه. دا اغېزه د زمزم اوبو طبيعي جوړښت ته منسوب شوی، چې پکې 34 ډوله عناصر شامل دي. د دغو عناصرو له ډلې، سوډيم (Na)، کلسيم (Ca)، کلورايډ (Cl) او مگنيزيم (Mg) په لوړه کچه شتون لري، چې دا اوبه د څښاک له عادي اوبو څخه ممتازوي. سربېره پردې، ځينې نادر او لږ موندل کېدونکي عناصر لکه کروميم (Cr)، منگانيز (Mn) او تيتانيوم (Ti) هم لري. که څه هم ځينې ضروري عناصر لکه کډميم، سرپ، ارسينیک او سيلېنيوم هم پکې موندل شوي، خو دا عناصر په دومره لږه اندازه موجود دي، چې د انسان روغتيا ته خطر نه پېښوي. له همدې امله، زمزم اوبه د سرطان ضد خوندي او طبيعي عامل گڼل کېږي، په ځانگړي ډول د انسان د کولمو د سرطاني حجرو په وړاندې (Khalid et al., 2014).

سرېره پردې، د زمزم اوبو pH کچه هم د عادي اوبو په پرتله لوړه ده، چې له 8.0-7.9 پورې ده، په داسې حال کې چې د عادي اوبو pH معمولاً د 6.5-7.0 په شاوخوا کې وي (Saudi Geological Survey, 2016). پخوانیو څېړنو ښودلې، چې ځینې زهرجن منرالونه لکه سیلینیم، ارسینیک او لیتیم په ځانگړو مقدارونو کې کولای شي، د کولمو د سرطاني لمفوسایتي حجرو د ودې مخنیوی وکړي او دا اغېزه د زمزم اوبو لخوا هم مشاهده شوې ده. د سرطان رامنځ ته کېدل له ځانگړي معافیتي میکانیزم سره تړاو لري، چې د تومور یا سرطاني دانو د کمښت سبب کېږي (Khalid et al., 2014).

په همدې لړ کې، څېړونکو د کولمو د سرطان په وړاندې د زمزم اوبو اغېزه مطالعه کړې ده. پایلو یې ښودلې، چې د زمزم اوبو درملنې د سرطان څپلو حجرو د ژوند وړتیا کمه کړې. دغه مړینه د حجروي مرگ (Cell Death) پر اساس ده. د ابتدایي حجروي مرگ کچه (3.5%, 3.0%) وه، په داسې حال کې چې دا کچه په کنټرول گروپ کې 2.8% وه. د زمزم اوبو په واسطه تر یوه ورځنۍ درملنې وروسته، د وروستي پړاو مړینه د پام وړ کچې (4.2%) ته لوړه شوې وه (Al Doghather et al., 2016).

همداراز، سراج او ملگرو یې د سینې او تخمدان په سرطاني حجرو باندې د زمزم اوبو سرطان ضد اغېزه ارزولې ده. د پایلو له مخې، د زمزم اوبو استعمال د حجرو تولید زیات کړی و، په داسې حال کې چې د عادي اوبو څښل دغه ځانگړتیا نه لري. زمزم اوبو د کیمیاوي درملنې (Chemotherapy) منفي اغېزه کمه کړې او د حجرو د پاتې کېدو (Cell Viability) کچه یې راټیټه کړې ده. د زمزم اوبو په واسطه درملنه، د درملنې له امله د سینې او تخمدان په سرطاني حجرو کې د رامنځ ته شویو میتابولیکي سیګنالونو لکه ERK1/2، MEK1/2، CRAF او P38 فوسفورایلېشن مخه نیولې ده. د څېړنې پایلې ښيي، چې د ERK1/2 پروتینونو خاموشول (Silencing) د درملنې په ترڅ کې د سینې او کولمو په سرطان کې د حجروي مړینې اندازه لوړه کړې ده. دا موندنې وړاندیز کوي چې د MAPK کورنۍ پروتینونه، په ځانگړي ډول ERK1/2، د زمزم اوبو په مرسته په تر سره کېدونکې درملنه کې د کیمیاوي درملنې (Chemotherapy) د منفي اغېزو د کمولو په پروسه کې مهم رول لري (Siraj et al., 2019).

زمزم اوبه، شکره او د وینې فشار

څېړنو ښودلې چې زمزم اوبه د لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره گټورې دي، ځکه چې دغه اوبه د بدن د ښه کولسترول (HDL) او بد کولسترول (LDL) پر کچو باندې د پام وړ اغېزه لري (Tama & Sagiran., 2019). یادو څېړونکو د T-test ازموینه تر سره کړې، چې تر درملنې مخکې او وروسته یې توپیر څرگند ښودلی (p < 0.05). خو بل لوري ته، د یوې بلېتر سره شوې څېړنې پایلې ښيي، چې د زمزم اوبو تر څښلو څو شیبې وروسته سیستولیک فشار (Systolic Pressure)، ډیاسټولیک فشار (Diastolic Pressure)، د زړه ضربان او د شریانونو منځنی فشار د پام وړ زیات شوی دی. دغو څېړونکو څرگنده کړې ده، چې د زمزم اوبو څښل د زړه Parasympathetic فعالیت زیاتوي، خو په خودکار فعالیت (Cardiac Sympathetic) باندې کومه

اغېزه نه لري. د غاز لرونکو اوبو په پرتله، زمزم اوبه د عصبي سيستم په يادو برخو کوم ځانگړې اغېزه نه بڼي (Latif et al., 2020).

په يوه تجربوي څېړنه کې، د مورگانو په بدن کې د انسولين او کولسترول پر کچه د زمزم اوبو اغېزه ارزول شوې ده. څېړونکو مورگانو ته 10 اونۍ د نل او زمزم اوبه د څښلو لپاره ورکړې (AlJuwaie et al., 2020). له يادې مودې وروسته يې يو شمېر پارامترونه، لکه د رژيم پر مهال د وينې گلوکوز، انسولين، د انسولين مقاومت، LDL کولسترول، HDL کولسترول، سوپر اکسايډ ډيسموټاز (SOD) او د شحمو اکسيډېشن کچه وازمويل شوه. پايلو وښودل، چې د زمزم اوبو دوامداره څښاک د رژيم پر مهال د وينې گلوکوز، انسولين او د انسولين مقاومت کچه راټيټوي. خو زمزم اوبو د شحمو، اکسيډېشن-ريډکشن (ريډوکس) توازن او د بدن په ترکيب باندې کومه ځانگړې اغېزه نه درلوده (AlJuwaie et al., 2020).

د Bamosa او همکارانو لخوا په ترسره شوې څېړنه کې، د دوهم ډول شکرې (Type 2 Diabetes) ناروغانو ته د زمزم اوبو څښلو سپارښتنه وشوه. د زمزم اوبو څښل د ناروغانو په بدن کې انتي اکسيډانتي وړتيا، د سوپر اکسايډ ډيسموټاز (SOD) او د گلوټاټيون (Glutathione) کچه په څرگند ډول لوړه کړې وه. څېړونکي دې پايلې ته ورسېدل، چې د زمزم اوبو څښل په شکره ناروغانو کې د گلايکېټ شوي هيموگلوبين (HbA1c) کچه راټيټوي، خو د نهارې د پلازما قند پر کچه يې کومه اغېزه نه ده ښودلې. په داسې حال کې، چې د کنټرول گروپ د يادو دواړو پارامترونو په کچه کې هېڅ بدلون نه دی راغلی (Bamosa et al., 2013).

د زمزم اوبو نورې روغتيايي گټې

يوه څېړنه د هغو ناروغانو په اړه تر سره شوې ده، چې د کولمو التهابي ناروغۍ (Inflammatory Bowel Disease) يې درلودې. په دې څېړنه کې څرگنده شوه، چې د ناروغانو کورنيو ته د بدليې او مکملې درملنې (Complementary & Alternative Medicine - CAM) په اړه ساده لارښوونې ورکړل شوې وې. د ناروغانو له ډلې، 66% يې د کورنۍ له خوا لارښوونې ترلاسه کړې وې، 62% يې عسل (شات) کارولي، 54% يې زمزم اوبه څښلې او 32% يې فزيکي تمرينونه کړي دي. ناروغان زيات وختونه د درنو شکايتونو پر مهال CAM لارو ته مخه کوي (Altunisi et al., 2020).

همداراز، د زمزم اوبو اغېزه له نورو اوبو سره د غاښونو د خرابېدو (Teeth Decay) پر خپرېدو او شدت ارزول شوې ده. په دې څېړنه کې د ښوونځي زده کوونکي (نجونې) په دوو ډلو (د مختلطو غاښونو لرونکي ډله او د دايمي غاښونو لرونکي ډله) کې وپېشل شوې. د کلينيکي معاینې پايلو ښودلې ده، چې په لومړۍ ډله کې مهم احصائيوې توپير نه و. خو د ټولو ماشومانو له جملې څخه د DMFT (Decayed, Missing, Filled Teeth) نومرې د هغو ماشومانو لپاره تر ټولو ټيټې وې، چې يوازې زمزم اوبه يې څښلې وې. دا ځکه چې په زمزم اوبو کې د فلورايد کچه لوړه ده. گڼو څېړنو ثابته کړې، چې فلورايد د غاښونو د خرابېدو مخه نيسي. همداراز، څېړنو ښودلې چې په څښاک اوبو کې د هر 1.0 ppm فلورايد شتون د غاښونو د سوري کېدو پېښې شاوخوا 50%

راکموې. نو ځکه په څښاک اوبو کې د فلورايد ټاکلې اندازه زیاتول د غاښونو د روغتیا لپاره ډېر گټور گڼل کېږي (Al Zuhair & Khounganian, 2006).

پایله

په دې لنډه مروري څېړنه کې د زمزم اوبو د کیمیاوي جوړښت په اړه ډېر مهم معلومات وړاندې شول او څرگنده شوه چې د زمزم اوبو څښل د نل د عادي اوبو په پرتله ډېرې روغتیایی گټې لري. دا گټې له دې امله دي، چې زمزم اوبه الفلي خاصیت لري او بدن ته ارزښتناک منرالونه رسوي. د مختلفو علمي څېړنو او مطالعو پایلې ښيي، چې زمزم اوبه نه یوازې انسانانو او حیواناتو لپاره گټورې دي، بلکې پر نباتاتو هم مثبت اغېزه لري. په مورکانو باندې ترسره شوې تجربوي څېړنې ښيي، چې زمزم اوبه د انسانانو د بېلابېلو ناروغيو کمولو او د سرطاني حجرو د ودې په مخنیوي کې مرسته کوي. دغه څېړنه تاییدوي، چې زمزم اوبه متوازن معدني او غذايي ترکیب لري، چې له ساینسي پلوه د دغو ځانگړتیاوو له امله د زمزم اوبه له نورو اوبو بېلې او ارزښتمنې دي.

اخځلیکونه

- Abdelsalam Elnour, A. E., Abdullah Bamosa, A. B., Al-Meheithif, A., & Khaled Aleissa, K. A. (2013). Amelioration of severe carbon tetrachloride toxicity by Zamzam water in rats. Ahmad, A. V. D., Ali, S. A., Sheikh, T., Choas, S., & Bagwan, R. (2018). A Review: Zam Zam a miracle water. *J Invent Biomed Pharma Sci*, 3(4), 1-5.
- Al-Barakah, F. N., Al-jassas, A. M., & Aly, A. A. (2017). Water quality assessment and hydrochemical characterization of Zamzam groundwater, Saudi Arabia. *Applied Water Science*, 7, 3985-3996.
- Al-Doghaiter, H. A., Al-Ghafari, A. B., Rahimulddin, S. A., Al Zahrani, S. M., Omar, A. S., & Omar, U. M. (2016). Evaluation of the potential anticancer activity of zamzam water in human colon cancer cell line. *Cancer Oncol. Res*, 4(3), 33-41.
- Algobol, A. (2010). The optical properties: water between a comparison of the magnetized Zamzam drum with water and water and distilled water and normal Karume Behnam Evan J Al-Fiz Department. *Abi Alter quantity of Conductor University*, 2, 148-158.
- AlJuwaie, G. F., Latif, R., AlSheikh, M. H., Al Sunni, A., & Chathoth, S. (2020). Effects of Zamzam water on glycemic status, lipid profile, redox homeostasis, and body composition in rats. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 15(1), 14-18.
- Al-Meheithif Abdullah, E. A., Abdullah, B., & Khaled, A. (2012). Antioxidant effects of Zamzam water in normal rats and those under induced-oxidative stress. *Journal of Medicinal Plants Research*, 6(42), 5507-5512.
- Alsokari, S. S. (2011). Zamzamwater-induced changes in growth and biochemical parameters in lentils. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 559-563.
- Altunisi Jr, A., Mosli, M., Banweer, M., Qari, Y., Arif, F. O., & Saadah, O. I. (2020). Patterns of complementary and alternative medicine use in Saudi Arabian patients with inflammatory bowel disease: A cross-sectional study. *Cureus*, 12(8).
- Al-Zuhair, N., & Khounganian, R. (2006). A comparative study between the chemical composition of potable water and Zamzam water in Saudi Arabia. *Saudi Dental Journal*, 18, 1-9.
- Bamosa, A., Elnour, A., Kaatabi, H., Al Meheithif, A., Aleissa, K., & Al-Almaie, S. (2013). Zamzam water ameliorates oxidative stress and reduces hemoglobina1c in type 2 diabetic patients. *J Diabetes Metab*, 4(03), 1-5.
- Bethke, C. M., & Johnson, T. M. (2008). Groundwater age and groundwater age dating. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 36(1), 121-152.

- El-desoukey, R. M. A. (2020). Comparative Microbiological Study on Zamzam Water. Zamzam with Ruqyah Comparative Microbiological Study on Zamzam Water, Zamzam with Ruqyah and Mineral Water.
- Emoto, M. (2005). *The true power of water: Healing and discovering ourselves*. Simon and Schuster.
- Hamed, B. A., Mutwally, H. M. A., & Omar, S. A. M. (2009). Some physiological parameters of the yields of *Vicia faba* L and *Triticum vulgare* L irrigated with Zamzam, desalinated and well water. *World Journal of agricultural sciences*, 5(4), 480-486.
- Hanaoka, K. (2001). Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. *Journal of Applied Electrochemistry*, 31(12), 1307-1313.
- Khalid, N., Ahmad, A., Khalid, S., Ahmed, A., & Irfan, M. (2014). Mineral composition and health functionality of Zamzam water: A review. *International journal of food properties*, 17(3), 661-677.
- Kufiyah, A. K., Bagasi, A. M. H., Nawlalili, S. M., Bazaid, D. S., Marghalani, A. A., & Fathi, A. (2021). Effect of Zamzam Water on Microhardness of Primary Tooth Enamel after Erosion Induced by Claritin Syrup: An In-vitro: Study. *Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry*, 11(2), 173-178.
- Latif, R., Majeed, F., Al Sunni, A., ALamrie, R. M. K., & AlNaimi, S. N. (2020). Acute effects of Zamzam water on blood pressure and heart rate variability. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 36(4), 755.
- Mashat, B. H. (2010). The Microbiological quality of Sabil (free) drinking water in Makkah Al-Mukarramah during Ramadan 2007. *Journal of King Abdulaziz University*, 21(2), 87.
- Nassini, R., Andrè, E., Gazzieri, D., De Siena, G., Zanasi, A., Geppetti, P., & Materazzi, S. (2010). A bicarbonate-alkaline mineral water protects from ethanol-induced hemorrhagic gastric lesions in mice. *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 33(8), 1319-1323.
- Omar, U. M., Al Doghaither, H. A., Rahimulddin, S. A., Al Zahrani, S. M., & Al-Ghafari, A. B. (2017). In vitro cytotoxic and anticancer effects of Zamzam water in human lung cancer (A594) cell line. *The Malaysian Journal of Medical Sciences: MJMS*, 24(3), 15.
- Pitocco, D., Zaccardi, F., Di Stasio, E., Romitelli, F., Santini, S. A., Zuppi, C., & Ghirlanda, G. (2010). Oxidative stress, nitric oxide, and diabetes. *The review of diabetic studies: RDS*, 7(1), 15.
- Reville, W. (2016). *The pseudoscience of creating beautiful (or ugly) water*. Highbeam Research.
- Saudi Geological Survey (2016) . Home. <https://sgs.gov.sa/en>
- Shomar, B. (2012). Zamzam water: concentration of trace elements and other characteristics. *Chemosphere*, 86(6), 600-605.
- Siraj, A. K., Begum, R., Melosantos, R., Albalawy, W., Abboud, J., Siraj, N., & Al-Kuraya, K. S. (2019). Zamzam water protects cancer cells from chemotherapy-induced apoptosis via mitogen-activated protein kinase-dependent pathway. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 118, 109376.
- Tama, Y. L., & Sagiran, S. (2019). The Effect of Zam-zam Water to the Lipid Profile (HDL & LDL) at White Mouse (*Rattus novergicus*). *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 19(2), 64-67.
- Yazdi, F. K., Monfared, A. S., Tashakkorian, H., Mahmoudzadeh, A., & Borzoueisileh, S. (2017). Radioprotective effect of Zamzam (alkaline) water: A cytogenetic study. *Journal of environmental radioactivity*, 167, 166-169.

Composition, Hydrology and Health Benefits of Zamzam Water-Review

Authors: Boshra et al., 2021

Translator: Mohammad Yaqoob Sarfaraz^{1*}

¹Department of Chemistry, Faculty of Education, Kandahar University, Kandahar,
Afghanistan

*Corresponding Translator Email Address: myaqoobsarfaraz@gmail.com

Abstract

Since before, many religions have used Zamzam water because they used it for treatment and other spiritual activities. This study reviews the composition, hydrology, and the effect of Zamzam water on human health. Zamzam water differs from regular water. Mineral deposits show it is alkaline and biologically has no biotic growth, and does not show toxicity signs. Zamzam is well-focused based on the expenditure of Makah hill. Zamzam well has been used for about 4000 years. Zamzam water is used for the treatment of many diseases. The data on Zamzam water composition, hydrology, and health benefits have been narratively reviewed. Future research is needed to investigate the other benefits and uses of Zamzam water on human health as antioxidants, antimicrobial, and its effects on cancer patients.

Keywords: Antioxidants, Antimicrobial, Spiritual Activities, Zamzam water

د څيرې پر نبات د حيواني سرې او نايټروجن نېټوونکو باکټرياو د اغيزو

ارزونه: مروړي څېړنه

شيرآغا بهير¹، قدرت الله احسان^{1*}، مختار احمد فيض¹

¹اگرانومي خانگه، نباتي علومو پوهنځي، د افغانستان د کرنيزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان

* د مسؤل ليکوال ايميل ادرس: qudrat.ehsan@gmail.com

لنډيز

څيره يو مشهور او لرغوني طبي بوټی دی. د څيرې تخمونه د بوي، درملو په جوړولو او د مصالجاتو په ترکيب کښي او په طبابت کښي د اوږد مهاله اسهالاتو، معدي، بد هضمي، تبې، التهاب، کانگي، د معدي ناراحتي او د رحم د اختلالاتو درملنه کي په زياته اندازه استعماليري. څيره د افغانستان لپاره يو مهم صادرات بلل کيري چي د کندهار په شمول په نورو ولايتونو کښي په زياته کچه کرل کيري. د څيرې نباتات هم د نورو نباتاتو په څېر غذايي عناصرو ته اړتيا لري. نايټروجن د نباتاتو پر وده او نمو باندي مسقيمه اغيزه لري. مايکرو ارگانيزمونه د خاوري په حاصلخېزي کښي ډېر رول لري، چي د اتموسفير ازاد نايټروجن د همدا ژونديو موجوداتو په واسطه د ليگيومي نباتاتو رينسو ته نصبيري. څېړنو په ډاگه کړي ده، چي د (*Azotobacter+Azospirillum*) باکټرياوي د اتموسفير نايټروجن تنظيموي او په ساحه کي د نايټروجن د ډېر نصب باعث گرځي. نو په همدې منظور چي د څيرې حاصلاتو او د کروندگرو عايداتو کښي د پام وړ لوړوالي راسي نو د يادو مايکرو ارگانيزمونه ترڅنگ د پنځه ټنه حيواني سرو د استعمال سپارښتنه کوو.

کلیدي کليمې: حیوانی سره، څیره، مايکرو ارگانيزم، نايټروجن

سريزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله واصحابه اجمعين.

څيره (*Cuminum cyminum* L.) له مهمو اقتصادي او طبي بوټو څخه شمېرل کيږي، چې د خوړو په خوندورتوب کښي هم استعمالیږي. څيره نبات د مني په موسم کښي کرل کيږي او د پسرلي په لومړيو مياشتو کښي حاصل ته رسيږي. د څيري نبات يو نقدي نبات (Cash Crop) بلل سوي دي، چې د کروندگرو او د ټولني په اقتصادي حالت ښه کولو کښي په زياته اندازه رول لري (Kumar et al., 2021). له همدې امله، کروندگر د څيري کښت کرلو ته ليوالتيا ښيي. د څيري نباتات د اقليمي شرايطو د بدلون په صورت کښي خورا حساس دي، چې د کرلو او حاصلاتو ټولولو لپاره ښه مديريت او پاملرني ته اړتيا لري (Indiastat, 2020).

د څيري نباتاتو کښت کول او استعمال د نړۍ په زياتو هيوادونو کي رواج لري، چې د جملي څخه يې هند د نړۍ 76% څيره توليدوي او د 2010 ميلادي کال راهيسي د څيري نباتاتو د کښت کولو پراخه ساحه، توليد، مصرف او صادراتو په برخه کي په نړۍ کي مخکښ هيواد بلل سوي دي (Mohit et al., 2021). افغانستان د وچ او نيمه وچ اقليم په لرلو سره د څيري د ښه حاصلاتو او توليداتو په منظور په زيات شهرت لري او په صنعت، درملو او همدارنگه د زینتي موادو په جوړولو کښي زيات استفاده کيږي (Pickersgill, 2005).

نايټروجنی سرې يو له هغو غذايي عناصرو د جملي څخه دي چې د نباتاتو، په ځانگړي توگه د څيري د نبات د ښي ودي لپاره ډېره اړين بلل کيږي. نايټروجن په عمومي توگه د څيري په وده او نمو کښي زيات رول لري، چې يوله مهمو محدودو غذايي عناصرو څخه گڼل کيږي (Kumar et al., 2025). هغه بيولوژيکي پروسه چې ليگومي نباتات يې د خپل د ميزبان سره د ريشو پواسط جوړوي، د ماليکولي نايټروجن فيکسيشن (نصب) په نوم ياديږي او په خاوره کښي د اتموسفير د ازاد نايټروجن د نصب کېدو سبب گرځي (Jami et al., 2018). دغه ډول پروسو عملي کولو لپاره يو ډول مايکرو ارگانيزمونه شتون لري چې يادي پروسې بشپړ کړي، چې د (*Azotobacter* او *Azospirillum*) بکټرياوو په نوم سره ياديږي (Bhat et al., 2015).

د يادي څېړنيزي او کتابتوني څېړني لپاره د يو لړ کتابونو، انټرنېتي سايټونو او معتبرو ژورنالونو د مطالعي څخه کار اخيستل سوي او د موضوع اړوند ارقام په تشرحي ډول سره بيان سوي دي.

موندني

څيره د صنعتي او طبي نباتاتو د جملي څخه ده چې د Apiaceae په کورني پوري اړه لري او په وچو او نيمه وچو سيمو کښي لکه د کندهار په شان اقليم لرونکو سيمو کښي کرل کيږي او ښه وده او حاصلات ورکوي. د څيري په تخمونو کي په لوړه کچه (Monosaturated Fats)، پروټين، ویتامين B، ویتامين E او يو شمېر نور غذايي منرالونه او عناصر په ځانگړي توگه اوسپنه لري (Mohammed et al., 2024). څېړنو ښودلې ده چې د حيواني سرې د خاورې فزيکي جوړښت په ښه کولو سره د څيري حاصل او غذايي ارزښت ښه کوي او په

همدي ډول عضوي سرې د خاورې عضوي کاربن زياتوي او د اوبو ساتني وړتيا لوړوي (Abd El Lateef et al., 2021).

د Patel او ملگرو د 2022، د تر سره سوي څېړنه ښيي چي د څيري پر وده او حاصلاتو باندي د حيواني سرو او نايټروجن نصب کوونکو باکټريا وو د پام وړ اغيزي لرلي او پايلي ښيي چي د نبات قد 74 سانتي متره، 1000 دانو تخمونو وزن 1.7 گرامه، د تخم شمير په هره غوتي (Follicle) کښي 75، د Follicle حاصل 5480 کيلو گرامه، د تخمونو حاصل 734 کيلوگرامه پر هکتار او د حاصلاتو شاخص 37% په يو وخت کي د (Azotobacter او Azospirillum) باکټرياوو او همدارنگه 5 ټنه حيواني سرو گډ استعمال په يوه هکتار ساحه کښي په لاس راغلي دي چي نسبت و نورو ټريټمينټونو ته ډېر دي (Patel et al., 2020). د دي څيړني نور ارقام په مقاييسي توگه په 1 جدول کښي واضيح سوي دي. همداشان، د نايټروجن نصب کوونکو باکټرياوو (Biological Fertilizers) په استعمال سره د شنه کيدو لوړ قابليت (92.8%)، لوړ قد لرونکي نبات (54.2 cm)، لومړيو ابتدايي ښاخونو زيات شمير (7.3 No/plant)، دوهمي ښاخونو زياتو شمير (11.4 No/plant)، د غوتيو شمير (21.5 No/plant)، په يوه غوتي کښي د تخمونو شمير (98.2 No/capsules)، د 1000 تخمونو لوړ وزن 3.2 گرامه، د تخمونو حاصل پر نبات (5.13 g/plant) او د تخمونو حاصل پر هکتار (1119 kg/ha) په هغه ساحه کي مشاهده سوي په کومو پلاټونو کښي چي لوړه د نايټروجن نصب کوونکو باکټريا (12 kg/ha) اچول سوي وه (Sahoo et al., 2022).

1- جدول: د څيري پر حاصلاتو باندي د نايټروجن نصبونکي باکټرياوو او حيواني سرو اغېزې

Treatment	Plant Height (cm)	Follicle Yield Kg/ha	1000 Seed weight (g)	Seed/Follicle	Seed yield Kg/ha	Harvest index %
Control	60.76	2785.5	1.76	53.42	300.25	26.71
Azotobacter	63.69	3541.5	1.78	61.25	419.05	30.63
Azospirillum	65.88	4714.2	1.72	56.75	552.65	28.38
Azotobacter+Azospirillum	74.61	5480.9	1.74	75.42	734.15	37.71
FYM 0 ton /ha	64.97	4107.1	1.72	52.91	464.25	27.37
FYM 2.5 ton /ha	64.94	4303.5	1.74	48.18	547.50	34.41
FYM 5 ton /ha	67.23	5170.5	1.75	55.27	576.11	30.41
FYM 7.5 ton /ha	67.80	2940.5	1.79	61.85	426.15	32.21

په ايران کښي ترسره سوي څيړنه د څير په کښت کښي د لږلگښته مایع سرې او بيولوژيکي (Azospirillum strains) گډ عمل څيړل سوي دي (2 جدول). په دي څيړنه کي د څيري تخم په لږلگښته مایع سره (لکه: اسپنه، زينگ، منگنيز، او مولېډينم) کښي څښت سوي دي او د وچيدو څخه وروسته د بيولوژيکي سره (lipoferum, brasilenese, irakense, strain of and strain 21) د څيري تخم سره داسي معامله سوي چي د تخم پر شاه وخوا سربيره يو پوښ (bio-primed) جوړ کړل سي. د څيړني پايلي روښانه کوي چي د څيري په کښتونو کي دغه ډول کرڼه دزياتو د ښي ودي او زياتو حاصلاتو سبب گرځي. په نيمه وچه او سړو سيمو کي

د لړلگښته سرې سره د بیولوژیکي سرې یو ځای استعمال د څيري په بوټي کي د غوټیو شمیر (Umble)، د تخمونو حاصل 425-455 کیلو گرامه پر هکتار، همداشان د څيري د تیلو (1.72 L/ha) انداز په بڼه شکل لوړه سوي وه نظر هغه ساحي ته چيري چي لړلگښته او بیولوژیکي سرې نه وي استعمال سوي چي په کنټرو پلاټونو کي د د څيري د تیلو اندازه (0.256 L/ha) په اندازه محاسبه سوي وه (Mirshekari & Roudsari, 2013).

2- جدول: د څيري پر حاصلاتو او تیلو پر تولید باندي لړلگښته عناصرو او د نايتروجن نصبوونکي باکتریاوو گډي اغېزې

Treatments	Weight of Seeds/Plant (g)	Weight of 1000 Seeds (g)	Essential Oil L/ha
T0M0	3.04 k	2.12 l	0.256
T0M1	3.15 j	2.19 k	0.265
T0M2	3.54 i	2.31 ij	0.391
T0M3	3.98 g	2.62 g	0.412
T1M0	3.13 j	2.27 j	0.561
T1M1	3.83 h	2.42 h	0.581
T1M2	4.11 f	2.73 f	0.683
T1M3	4.57 d	3.14 c	0.704
T3M0	3.60 i	2.37 hi	0.778
T3M1	4.16 f	2.76 f	0.808
T3M2	5.14 c	3.05 d	0.868
T3M3	5.89 b	3.47 b	0.918
T4M0	4.09 f	2.72 f	0.998
T4M1	4.37 e	2.93 e	1.07
T4M2	5.93 b	3.53 ab	1.67
T4M3	6.10 a	3.55 a	1.72
LSD (0.05)	0.0713	0.0633	0.003
CV %	5.58	6.25	0.120

نوټ: T د نايتروجن نصب کوونکو باکتریاوو ډولونه دي (biofertilizer Azospirillum) او M د زینک او باریوم بیلابیلی اندازي دي. د انگلیسي حروف د مشاهداتو تر منځ احصایوی توپیر ښيي.

T0 = 0 kg biofertilizer/ha (control), T1 = 4 kg /ha, T2 = 8 kg biofertilizer/ha, T3 = 12 kg biofertilizer/ha and M0 = 0 kg/ha (control), M1 = 4 kg Zn/ha, M2 = 2 kg B/ha, M3 = 4 kg Zn+2 kg B/ha

مناقشه

دا چي څیره د نړي په مختلفو هیوادونو کي کرل کيږي او د بیلابیلو موخو په حیث چي د هغي جملي څخه څیره د تنفسي ستونزو، میتابولیک سیندروم، د شکرې ناروغي، لوړفشار، التهابي ناروغيو، د انساني سرطانو، گاستروپروتيک، هیپاتوپروتيک، نیفروپروتيک او نیوروپروتيک ناروغيو په تداوي کښي استفاده کيږي (Srinivasan, 2018). سره لدې چي څیره د انسانانو د صحت په برخه کي یو ډیر مهم طبي نبات بلل کيږي

همداشان، د څيري تخمونه اشپزي د خوند د زياتولو لپاره هم کارول کيږي او په اوسني وختونو کې د خوړو د ساتني لپاره هم کارول کيږي (Kabak & Dobson, 2009).

دا چې غذايي مواد د هر نبات د ودې او حاصل ورکولو لپاره ضروري ده څيره هم د نورو نباتاتو په شکل د خپل ودې او د ژوند دوران د پوره کولو لپاره اړينو غذايي عناصرو ته اړتيا لري، په ځانگړې توگه، نايټروجن چې د نباتاتو وده چټکه کوي (Rana et al., 2018). د څيري د نبات دښې ودې او لوړ باکفيته حاصلاتو د توليد په موخه دا اړينه ده چې د دې نبات ټول اړين غذايي مواد د خاورې د حاصل خيزي په موخه د څيري په کښتونو کې برابر کړل سي (Hassanzadehdelouei et al., 2013). همدا ډول (Sayed et al., 2024) راپور ورکوي چې د څيري پر نباتاتو باندې د نايټروجن نصب کوونکې باکټريايو د پام وړ تاثير لري دا ځکه چې په خاوره کې دغه مايکرواورگانيزومونو د فعاليت په اساس په خاوره کې د نايټروجن اندازه نورهم زياتيزي چې او د څيري نبات د نايټروجن اړتيا پوره کيږي او دا نبات نور هم تقويه کيږي (Miri et al., 2013; Obaid et al., 2024). دحياتي سري د نايټروجن نصب کوونکو باکټرياو په وسيله دسري غذايي موادو اقتصادي کاروني ته اسانتياوي برابروي (Ghanepasand et al., 2014; Meena et al., 2015). حيواني سري د خاورې فزيکي جوړښت په ښه کولو سره د څيري او د خاورې د لندبل په ساتلو سره نور هم د مايکرواورگانيزومونو لپاره د فعاليت زمينه برابروي او په همدې ډول عضوي سري په استعمال سره د خاورې عضوي کاربن زياتيږي او د اوبو ساتني وړتيا لوړيږي او په دې فعاليت سره د ځينو نورو اړينو غذايي موادو و نبات د جذب وړتيا زياتيږي چې په دې سره د کرل سوي نبات حاصل د کيفيت او کميت له رويه په صحيح ډول ښه کيږي (Abd El Lateef et al., 2021). په هرصورت، په کرونده کې د عضوي او بيولوژيکي سرو گډ استعمال نه يوازي بزگرانو ته اقتصادي گټه رسوي، بلکې د خاورې په ښه کولو او ساتلو کې هم مرسته کوي (Panse & Sukhatme, 1967).

پايله

د څېړنو پايلې ښيي چې د حيواني او بيولوژيکي سرو (Biofertilizers) په ځانگړې توگه د نايټروجن نصب کوونکو باکټرياوو، استعمال د څيري د حاصلاتو د کميت او کيفيت دواړو لپاره مثبتې اغېزې ښيي. د نايټروجن نصب کول او د حيواني سري استعمال د داني او پروړو د حاصلاتو په زياتوالي کې مرسته کوي. عضوي سري استعمال د بيولوژيکي سرو موثريت نور هم زياتوي دا ځکه چې د بياکټرياوو د گډ ژوند لپاره نور هم پراخه زمينه برابريږي چې په دې برخه کې د څيري نباتاتو پر وده، حاصل، او د حاصلاتو پر کيفيت باندې مثبت اغېزې رامنځته کيږي. د بيولوژيکي سرو او حيواني سرو په گډ استعمال سره په ځانگړې توگه د *Azotobacter* او *Azospirillum* فعاليت نور هم زياتيږي او د څيري حاصل په اوسط ډول تر 5480 کيلو گرام په يوه هکتار کښي رسيږي. په هر صورت، اړتيا ليدل کيږي، چې نورو هم د حيواني سري او نايټروجن نصب کوونکو باکټرياوو استعمال په اړه د افغانستان په سيمه کې څيړني ترسره کړل سي او دا معلومه سي چې کومه اندازه حيواني او بيولوژيکي سري د څيري د حاصلاتو د زياتوالي تر ټولو ښه او مناسب انډول دي.

سپارښتني

1. د څيري په يوهکنار کښت کې د پنځه ټنه حيواني سرې سره د بيولوژيکي سر (Asospirillum Azotobacter) استعمال د څيري په وده او حاصلاتو کښي د پام وړ زياتوالي منځ ته کوي.
2. د کم لگښت عناصرو سره د څيري تخم معامله کوي او وروسته د بيولوژيکي سرې سره گډول د څيري په حاصلاتو او وده باندي مثبتې اغيزې کوي.

اخځليکونه

- Abd El Lateef, E. M., Wali, A. M., & Abd El-Salam, M. S. (2021). Effect of manure sources and rates on nitrogen replacement value, sesame yield and nutrient content under drip irrigation system. *Bulletin of the National Research Centre*, 45(1), 88.
- Bhat, T. A., Ahmad, L., Ganai, M. A., & Khan, O. A. (2015). Nitrogen fixing biofertilizers; mechanism and growth promotion: a review. *J Pure Appl Microbiol*, 9(2), 1675-1690.
- Ghanepasand, F., Noormohamadi, G., Haj, S. H. M. R., & Darzi, M. T. (2014). Influence of manure application and nitrogen fixing bacteria on yield and yield components of black cumin (*nigella sativa* l.).
- Hassanzadehdelouei, M., Vazin, F., & Nadaf, J. (2013). Effect of salt stress in different stages of growth on qualitative and quantitative characteristics of cumin (*Cuminum cyminum* L.) *Cercetări Agronomice*; 46:89-97.
- Indiastate. (2020). Socio-Economic Statistical Data and Facts about India from 2010 to 2020. www.indiastate.com 2020.
- Jami, M. Y., Filabi, A. and Amini Dehaghi, M. 2018. Effect of irrigation regimes on yield, yield components and characteristics criteria of essential oil percentage of cumin (*Cuminum cyminum* L.) ecotypes in Afghanistan. *Journal of Agroecology* 10(4): 983-1005.
- Kabak, B., & Dobson, A. D. (2009). Biological strategies to counteract the effects of mycotoxins. *Journal of food protection*, 72(9), 2006-2016.
- Kumar, C., Tetarwal, A. S., Dudi, A., Ahirwar, M. K., & Singh, D. (2025). Impact of integrated nutrient management on growth and yield of cumin (*Cuminum cyminum* L.) in western Rajasthan. *Indian Journal of Arid Horticulture*, 7(1), 53-58.
- Kumar, M., Sahoo, P. K., Kushwaha, D. K., Saxena, S. N., Mani, I., Singh, G., & Pradhan, N. C. (2021). Cumin cultivation: Present status and future prospects. *Pharma Innov. J*, 10, 1121-1123.
- Meena, S. S., Mehta, R. S., Lal, G., Sharma, Y. K., Meena, R. D. & Kant, K. 2015. Effect of sowing dates and crop geometry on growth and seed yield of dill (*Anethum sowa* L.). *Int. J. Seed Spices* 5(1): 79-82.
- Miri, Y., Kochebagh, S. B., & Mirshekari, B. (2013). Effect of inoculation with bio-fertilizers on germination and early growth, dill (*Anethum graveolens*), Fennel (*Foeniculum vulgare*), Cumin (*Cuminum cyminum*) and Marigold (*Calendula officinalis*).
- Mirshekari, B., & Roudsari, A. M. (2013). Bio-nutrient seed priming may improve growth and essential oil yield of cumin (*Cuminum cyminum* L.).
- Mohammed, F. S., Sevindik, M., Uysal, İ., Česko, C., & Koraqi, H. (2024). Chemical composition, biological activities, uses, nutritional and mineral contents of cumin (*Cuminum cyminum*). *Measurement: Food*, 14, 100157
- Mohit, H., Sanjay, M. R., Siengchin, S., Khan, A., Marwani, H. M., Dzudzevic-Cancar, H., & Asiri, A. M. (2021). Effect of TiC nanoparticles reinforcement in coir fiber-based bio/synthetic epoxy hybrid composites: mechanical and thermal characteristics. *Journal of Polymers and the Environment*, 29, 2609-2627.

- Obaid, H., Fazil, K., Sharifi, S., Ehsan, Q., Nazir, R., Zaryal, K., & Seerat, W. A. (2024). Soil properties evaluation under different irrigation sources in the Semi-arid Region of Kandahar, Afghanistan. *Nangarhar University International Journal of Biosciences*, 161-164.
- Panse, V. G. & Sukhatme, P. V., 1967. Statistical methods for agricultural workers, ICAR Pub., New Delhi, p, 361.
- Patel, R., Patel, P. H., Desai, S., & Joshi, J. (2020). Effect of Variety, Levels of Fertilizer and Bio-fertilizer on Growth and Yield of Cumin (*Cuminum cyminum* L.). *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci*, 9(11), 1929-1937.
- Pickersgill, Barbara (2005). *Prance, Ghilleain; Nesbitt, Mark (Eds.). The Cultural History of Plants. Routledge. p. 162. ISBN 0415927463.*
- Rana, A. S. H. I. T. A., Kumar, V. I. P. U. L., Mirza, A. N. I. S., & Panghal, A. N. I. L. (2018). Efficacy of cumin (*Cuminum cyminum* L.) as a bio nutrient and its management. *Ann. Biol*, 34(2), 218-222.
- Sahoo, M., Satapathy, M., Mangaraj, S., & Paikaray, R. K. (2022). Effect of integrated nutrient management on yield and nutrient uptake of sesame (*Sesamum indicum* L.). *Journal of Eco-friendly Agriculture*, 17(2), 253-258.
- Sayed, Y. A., Ali, A. M., Ibrahim, M. F., Fadl, M. E., Casucci, C., Drosos, M., ... & Al-Sayed, H. M. (2024). Impact of Poultry Manure-Derived Biochar and Bio-Fertilizer Application to Boost Production of Black Cumin Plants (*Nigella sativa* L.) Grown on Sandy Loam Soil. *Agriculture*, 14(10), 1801.
- Srinivasan, K. (2018). Cumin (*Cuminum cyminum*) and black cumin (*Nigella sativa*) seeds: traditional uses, chemical constituents, and nutraceutical effects. *Food quality and safety*, 2(1), 1-16.

A Review of the Effects of Animal Manure and Nitrogen-Fixing Bacteria on Sesame Yield and Yield Components

Shir Agha Baheer¹, Qudratullah Ehsan^{1*}, Mukhtar Ahmad Faiz¹

¹Department of Agronomy, Faculty of Plant Sciences, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: qudrat.ehsan@gmail.com

Abstract

Cumin (*Cuminum cyminum* L.) has been recognized as one of the most important, famous, ancient and medicinal plants in many parts of the world for centuries. Cumin seeds are known for their aroma, medical properties, and many food and spice ingredients. Cumin seeds have a lot of medical value, which are used in large quantities in the treatment of long-term diarrhea, indigestion, stomach, fever, vomiting, constipation, stomach discomfort and uterine disorders. Possibly in Central Asia, Southwest Asia, or the Eastern Mediterranean, as well as in India, Syria, Iran, Turkey, Afghanistan, Nepal, Myanmar, of which India produces 76 % of the world cumin, Afghanistan Kandahar, Badakhshan, Jawzjan, Uruzgan, Dayakandi, Nimroz, Zabul, Helmand, Balkh, Samangan, Fara, Badghis and Paktika are the main producers. Some plants also need nutrients like other plants, including nitrogen, which has a direct effect on the growth and yield of plants, and regulates atmospheric nitrogen to meet the nitrogen needs of the field. Microorganisms play a major role in soil fertility, and through leguminous plants, free atmospheric nitrogen is fixed in the soil by these organisms. Results of this investigation showed that the maximum seed yield obtained when *Aotobacter*+*Azospirillum* inoculated with cumin seeds and 5 ton manure/ha applied. Combined application of nitrogen fixing bacteria and manure can be helpful in developing production and yield of Cumin crops.

Keywords: Cumin, Farm Yard Manure, Micro Organism, Nitrogen

د سرې ملی پر وده او حاصل باندي د کرلو د وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو

اغېزې

محبیب الله فیضی¹، فرید احمد ولي¹، نقیب الله مجددي¹، نجیب الله مجددي¹، صدیق الله احساس¹، رحیم الله همت

خواه¹، زاهدالله آرين¹، عنایت الله محمدي¹

¹هارټیکلر خانگه، نباتي علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژی ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان

* د مسؤل لیکوال ایمیل ادرس: muhib.mfms@gmail.com

لنډيز

دا څېړنه د کندهار ولایت د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژی ملي پوهنتون په څېړنیز فارم کې د سرې ملی پر وده او حاصل باندي د کرلو د وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو اغېزې باندي ترسره سوېده. په دې څېړنه کې د سرې ملی پر وده او حاصل باندي د بوټو د کرلو د وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو اغېزې په نظر کې نیول سوي او د Randomized Complete Block Design (RCBD) ډیزاین په کارولو سره د شپږو چلندونو (Treatments) او دريو مختلفو تکرارونو (Replications) درلودونکې ده. د څېړنې په جریان کې د کرلو دوه مختلف وختونه چې لومړی یې فبروري شپاړسمه (16) چې د دلوي د اوویشتمې (27) نېټې سره سمون خوري او دوهم یې د مارچ دوهمه (2) چې د حوت د یولسمې (11) نېټې سره سمون خوري او د بوټو ترمنځ په درو مختلفو فاصلو (45x10) (45x20) او (45x30) کې د سرو ملی پر وده او حاصل باندي د کرلو د وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو اغېزې په نښه کوي. چې په دې دواړو میاشتو کې غوره میاشت د فبروري میاشت او غوره فاصله (45 x 20) سانتي متره وه او په ټولو فاصلو کې غوره حاصل، لوړ قد لرونکي نباتات او زیاتي پاني تر لاسه او نسبتاً مارچ ته نښه پایله ورکړې ده، چې همدا اندازه او د کرلو وخت د ټولني د مسلک پوهانو او کروندگرو لپاره سپارښتنه کوو.

کلیدي کلیمې: د کرلو وخت، سرې ملی، فاصله، وده او حاصل

سريزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله واصحابه اجمعين.

دا چي افغانستان يو کرنيز هيواد دی او د خپل موقعيت په درلودلو سره د نباتاتو په زړه پوري ودي او توليد لپاره د لوړو او ژورو سطحو په لرلو سره، په خاص ډول د سبو، میوو او گلانو لپاره په زړه پوري اقليم درلودونکی دی. سرې ملى د مهمو سبو د ډلي څخه دي او خوراكي ارزښت يې د نورو سبو په پرتله ډېره اوسپنه (Fe)، کلسيم (Ca) او سوډيم (Na) لري. د سرو ملىو پاني د رينې په پرتله ډير کلسيم، فاسفورس (P)، ویتامين سي (C) او پروتین لري چي په خام ډول او هم په ځينو هيوادونو کي په پاخه ډول استعماليري. د ځيگر د ناروغې مخنيوی کوي او د مثاني د ستونزي د ليري کولو لپاره گټوري دي او د ادرار (Urine) ستونزي ليري کوي، د سرو ملى د نیلو په هر 100 گرامو وزن کي 94.4% او به (H₂O)، 3.4 گرامه کاربوهايډرید 0.7 گرامه، پروتین 0.06 گرامه تيامين 0.02 ملي گرامه رايبو فلاوين 15 ملي گرامه ویتامين سي 35 ملي گرامه کلسيم او 0.04 ملي گرامه اوسپنه لري، نو ويلاى سو چي سرې ملى د مهمو سبو د ډلي څخه دي او هم د طبي او خوراكي ارزښتونو لرونکي دي (Rani et al., 2010).

سرې ملى د ريننه لرونکو سبو له ډلي څخه دي چي علمي نوم يې (*Raphanus sativua L.*) او Brassicaceae کورنۍ پوري تړاو لري، چي په استوايي او معتد لو سيمو کي تر ټولو ډېر کښت کېدونکي سابه دي سرې ملى د خپل نازک جوړښت او خوړ خوند لرلو په اساس د خوړولو وړ رينبو لپاره کرل کيري. د سرو ملىو د کمي ودي او ټيټ حاصل يو لامل کرنيزي طريقي دي. د ښه کيفيت او غوره رينبو د توليد لپاره د سرو ملىو د کښت مناسب وخت او د بوټو مناسبې شمېرني ته اړتيا لري ځيني سپارښتني سته چي د کښت نېټه او د بوټو مناسب شمير د سرو ملىو د کښت پر وده او رينبو په حاصل کي بدلون راولي کوم چي اقتصادي گټي لري. (Ahmad et al., 2018; Sharma & Mehta, 2020).

په بنگله ديش هيواد کي ترسره سويو څېړنو ښودلې چي د سرو مليو د ودي او حاصل لپاره د قطارونو ترمنځ شل (20) سانتي متره او د بوټو ترمنځ لس (10) سانتي متره فاصله غوره ده (Lavanya et al., 2017; Alam et al., 2010). په بنگله دپش هيواد کي سرې ملى خورا د مشهورو سبو له جملې څخه دي کوم چي د ویتامين سي (اسکوربيک اسيد) ښه سرچينه ده چي په هر سل (100) گرامه خوراک کې (34-40) ملي گرامه ویتامين سي وجود لري او هم د بېلابيلو منرالونو سرچينه ده. په سرو ملىو کې شامل د کم مقدار فلزات عبارت دي له: المونيم (Al)، باريوم (Ba)، ليتيم (Li)، منگانيز (M)، سيلکان (Si) ټيتانيوم (Ti)، فلورين (F) او ايودين (I) (تر 18 مايکرو گرامه/100 گرامه). سر بېره پر ياد غذايي ارزښت د ياد سابه نرمي پاني چي د سبو په توگه کارول کېږي چي په زياته اندازه د ویتامين A او C درلودونکي دي او همدارنگه د ياد سابه رينې په لوړه کچه د کاربوهايډریت او پروتین لرلو سره ډېر مشهور دي (Sandipan & Rawat, 2020; Sahu et al., 2018).

سرې ملي. د هغه ځوانو نرمو رينبو لپاره کرل کېږي چې په سلات کې په خام ډول خوړل کېږي يا د نورو سبو په ډول په پاخه ډول استفاده کېږي او همدارنگه د خوړو مخکي د اشتها را وړلو په توگه کارول کېږي (Hussain et al., 1985; Alam & Farooque, 2013).

د نوموړي څېړني په پايله کې به مور د سرو مليو د بڼې ودي او بڼه حاصل لپاره د کرلو مناسب وخت ترلاسه کړو او همدارنگه د بوټو ترمنځ به فاصله هم مشخصه سي ترڅو په راتلونکي کښي کرونده گر او د سبو کښت کوونکي د سرو مليو د کښت لپاره مناسب وخت او د بوټو ترمنځ مناسبه فاصله مشخصه کړي ترڅو کرونده گر د نوموړي سابه څخه بڼه حاصل او عايد ترلاسه کړي.

مواد او کړنلاره

دا څېړنه چې د افغانستان د کرنيزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون په څېړنيز فارم کې د سرې ملي پر وده او حاصل باندي د کرلو د وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو اغېزي تر عنوان لاندې ترسره سوې ده، چې د بوټو ترمنځ فاصلې يې لس (10) سانتي متره، شل (20) سانتي متره، ديرش (30) سانتي متره په نظر کې نيول سوې او د کښت مختلف وختونه يې شپاړلسم (16) د فبروري او دوهم (2) د مارچ د 2025 ميلادي کال وه. نوموړې څېړنه د (RCBD) په ډيزاين سره تنظيم سوې وه. د يادې څېړني لپاره د گشتارز (Geshtarz) نوعه انتخاب سوې کوم چې د ټوکېدنې قوت يې پنځه نوي (95) % وه. د يادې څېړني د چلندونو شمېر شپږ (6) او د تکرارونو شمېر درې (3) او هم د کوردونو اندازه 1.5×1.5 متره کې انتخاب سوې چې د کوردونو شمېر يې اتلس (18) او هم يې د کوردونو ترمنځ فاصله پنځوس (50) سانتي متره ټاکل سوې وه. په ياده څېړنه کې دوه ځلي معلومات راټول سوي چې لومړي معلومات شپږويشت (26) ورځي وروسته تر کښت او دوهم ځلي معلومات پنځه پنځوس (55) ورځي وروسته راټول کړل سويدي چې ياد راټول کړل سوي معلومات (د نبات د قد لوړوالی، د پاڼو شمېر او په يوه کورد کې د حاصل د اندازې) څخه عبارت دي، چې د نبات د قد لوړوالی په سانتي متر سره او په يوه کورد کې د کښي د حاصل اندازه په کيلو گرام سره محاسبه سوېده.

موندني

د نبات د قد لوړوالی: د کښت کولو څخه وروسته د فبروري د مياشتې پر شپږويشت (26) د لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (15.8) سانتي متره په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي ورپسې- په ورته مياشت او ورځو کې په دوهمه اندازه لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (14.55) سانتي متره 45×10 A1 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي او همدارنگه په دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کې لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (13.6) سانتي متره په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي.

د مارچ د مياشتې پر شپږويشتمه (26) بيا د لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (13.4) سانتي متره په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي ورپسې په ورته مياشت او ورځو کې په

دوهمه اندازه لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (12.6) سانتي متره 45×10 A1 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي او همدارنگه په ترتيب سره دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کې لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (10.47) سانتي متره په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي چې په دې دواړو مياشتوکي غوره مياشت د فبروري مياشت او غوره فاصله 45×20 A2 سانتي متره ښودل سوېده.

د فبروري او مارچ مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کې زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چې د پانو شمېر يې په اوسط ډول سره (9.490) پاني په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي، ورپسې په ورته مياشت او ورځو کې په دوهمه اندازه زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چې د پانو شمېر يې په اوسط ډول سره (7.330) پاني په 45×10 A1 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو په موده کې يې چې د پانو شمېر يې په اوسط ډول سره (6.773) ښودل سوی اندازه په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي.

د مارچ او اپريل مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کې زيات شمير پاني لرونکي نباتات چې د پانو شمېر يې په اوسط ډول سره (9.490) ښودل سوي په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي ورپسې دوهمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کې زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چې د پانو شمير يې په اوسط ډول سره (9.217) پاني په 45×10 A1 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کې زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چې د پانو شمېر يې په اوسط ډول سره (5.927) ښودل سوی په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي چې په دې دواړو مياشتوکي غوره مياشت د فبروري مياشت او غوره فاصله 45×20 A2 سانتي متره ده او په ټولو فاصلو کې نسبتاً د مارچ په مياشتي کې په زړه پوري پايله ثبت کړل سوېده.

د فبروري او مارچ مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کې لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (16.550) سانتي متره په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي ورپسې په ورته مياشت او ورځو کې په دوهمه اندازه لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (15.860) سانتي متره 45×10 A1 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کې لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (13.927) سانتي متره په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي.

د مارچ او اپريل مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو کې لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (14.807) سانتي متره په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي ورپسې په ورته مياشت او ورځو کې په دوهمه اندازه لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (13.987) سانتي متره 45×10 سانتي متره فاصله کې لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کې لوړ قد

لرونکي نباتات چي په اوسط ډول يې د قد اندازه (12.397) سانتي متره په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي چي په دې دواړو مياشتوکي غوره مياشت د فبروري مياشت او غوره فاصله 45×20 A2 سانتي متره ده او په ټولوفاصلو کي نسبتاً د مارچ په مياشتي کي په زړه پوري پايله ثبت کړل سوېده.

د پاڼو شمېر: د فبروري د مياشتي د شپږويشت (26) ورځو په موده کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼوشمېر يې په اوسط ډول سره (7.5) ښودل سوی په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي، ورپسې په ورته مياشت او ورځو کي په دوهمه اندازه زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼو شمېر يې په اوسط ډول سره (7.487) ښودل سوی په 45×10 A1 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کي د پاڼو شمير لرونکي نباتات چي د پاڼو شمېر يې په اوسط ډول سره (6.477) ښودل سوی په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي.

د مارچ د مياشتي د شپږويشت (26) ورځو په موده کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼوشمېر يې په اوسط ډول سره (7.3) ښودل سوی په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي ورپسې دوهمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼوشمېر يې په اوسط ډول سره (5.53) ښودل سوی په 45×10 A1 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼوشمېر يې په اوسط ډول سره (5.48) ښودل سوی په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي. چي په دې دواړو مياشتوکي غوره مياشت د فبروري مياشت او غوره فاصله 45×20 A2 سانتي متره ده او په ټولوفاصلو کي نسبتاً د مارچ په مياشت کي په زړه پوري پايله ثبت کړل سوېده.

د فبروري او مارچ مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼوشمېر يې په اوسط ډول سره (9.490) ښودل سوی په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي، ورپسې په ورته مياشت او ورځو کي په دوهمه اندازه زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼوشمېر يې په اوسط ډول سره (7.330) ښودل سوی په 45×10 A1 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو شمېر کي چي د نباتات د پاڼو شمېر يې په اوسط ډول سره (6.773) ښودل سوی په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي.

د مارچ او اپريل مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼو شمېر يې په اوسط ډول سره (9.490) ښودل سوی په 45×20 A2 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي ورپسې دوهمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼو شمېر يې په اوسط ډول سره (9.217) ښودل سوی په 45×10 A1 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي او همدارنگه دريمه اندازه په ورته مياشت او ورځو کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چي د پاڼو شمېر يې په اوسط ډول سره (5.927) ښودل سوی په 45×30 A3 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي چي په دې دواړو مياشتوکي

غوره مياشت د فبروري مياشت او غوره فاصله A2 20 x 45 سانتي متره ده او په ټولو فاصلو كې نسبتاً د مارچ په مياشت كې په زړه پوري پايله ثبت كړل سوېده.

حاصل: د فبروري او مارچ مياشتو پنځه پنځوس (55) ورځو په موده كې لوړ حاصل اندازه (2.887) كيلوگرامه په A2 20 X 45 سانتي متر فاصله كې لاسته راغلي دي ورپسې د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده كې د فبروري د مياشتي دوهمه اندازه حاصل چي د حاصل اندازه يي (2.573) كيلوگرامه ده په A1 10 X 45 سانتي متر فاصله كې لاس ته راغلي دي او په ورته مياشت او ورځو كې A3 30 X 45 سانتي متره فاصله كې (2.370) كيلوگرامه حاصل لاس ته راغلي دي.

د مارچ او اپريل مياشتو د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده كې غوره او لوړ حاصل اندازه (2.500) كيلوگرامه دي په A2 20 X 45 سانتي متره فاصله كې لاسته راغلي دي همدا رنگه په ورته مياشت او ورځو كې دوهمه اندازه حاصل اندازه (2.410) كيلوگرامه دي په A1 10 X 45 سانتي متر فاصله كې تر لاسه سوي دي اورپسې په ورته مياشت او ورځو كې په A3 30 X 45 سانتي متره فاصله كې (2.197) كيلوگرامه حاصل لاسته راغلي دي چي په دي دواړو مياشتو كې غوره مياشت فبروري او غوره فاصله A2 20 X 45 سانتي متره ده او په ټولو فاصلو كې نسبتاً د مارچ په مياشتي كې په زړه پوري پايله ثبت كړل سوېده.

1- جدول: (د سرو ملى د نباتاتو جگوالی د شپږويشت (26) ورځو په موده كې)

Plant Height (days)			
Plant Spacing	B1(February 16)	B2(March2)	Mean A
A1(45X10cm)	15.860	13.987	14.923
A2(45X20cm)	16.550	14.807	15.678
A3(45X30cm)	13.927	12.397	13.162
Mean B	15.446	13.730	
	CD (P≤0.05)	SE(d)	SE(m)
Factor A	0.458	0.203	0.144
Factor B	0.374	0.166	0.117
Intraction A X B	0.440	0.287	0.203

2- جدول: (د سرو ملى د نباتاتو د پاڼو شمېر د شپږويشت (26) ورځو په موده کې)

Number of Leaves for 26 days			
Plant Spacing	B1(February 16)	B2(March2)	Mean A
A1(45X10cm)	7.487	5.53	6.543
A2(45X20cm)	7.557	7.307	7.397
A3(45X30cm)	6.477	5.48	5.978
Mean B	6.477	6.106	
	CD (P≤0.05)	SE(d)	SE(m)
Factor A	0.328	0.146	0.103
Factor B	0.328	0.146	0.103
Intraction A X B	0.465	0.206	0.146

3- جدول: (د سرو ملى د نباتاتو د پاڼو شمېر د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کې)

Number of Leaves for 55 days			
Plant Spacing	B1(February 16)	B2(March2)	Mean A
A1(45X10cm)	14.550	12.683	13.617
A2(45X20cm)	15.807	13.463	14.635
A3(45X30cm)	13.697	10.470	12.083
Mean B	14.684	12.206	
	CD (P≤0.05)	SE(d)	SE(m)
Factor A	0.370	0.164	0.116
Factor B	0.302	0.134	0.095
Intraction A X B	0.524	0.232	0.164

4- جدول: (د سرو ملى د نباتاتو جگوالی د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کې)

Plant Height (days)			
Plant Spacing	B1(February 16)	B2(March2)	Mean A
A1(45X10cm)	2.573	2.410	2.537
A2(45X20cm)	2.887	2.500	2.648
A3(45X30cm)	2.370	2.197	2.283
Mean B	2.610	2.369	
	CD (P≤0.05)	SE(d)	SE(m)
Factor A	0.255	0.113	0.080
Factor B	0.208	0.092	0.065
Intraction A X B	0.288	0.160	0.113

Yield per Flot (kg)			
Plant Spacing	B1(February 16)	B2(March2)	Mean A
A1(45X10cm)	7.330	9.217	8.273
A2(45X20cm)	9.417	9.490	9.453
A3(45X30cm)	6.773	5.927	6.350
Mean B	7.840	8.211	
	CD (P≤0.05)	SE(d)	SE(m)
Factor A	1.001	1.001	1.001
Factor B	0.443	0.443	0.443
Intrraction A X B	0.314	0.314	0.314

مناقشه

ددې څېړني پايلې وښودله چې د سرو مُلیو پر وده او حاصل باندي د کرلو وخت او بوټو ترمنځ د فاصلو اغېزې د یاد نبات د ودې او حاصل پر کمیت او کیفیت دواړو باندي څرگند اغېز لري؛ که څه هم د نباتاتو ترمنځ پراخه فاصله د هر نبات لپاره د فضا او غذايي موادو د زیات موجودیت له امله د نبات لوړوالی، د پاڼو شمېر، حاصل او همدارنگه د نبات رېښې زیات ښودلي؛ خو دا د ټولیز حاصل په کچه منفي اغېز کړی. برعکس د نباتاتو لپاره ناوخته کرنه سره له دې چې د هر نبات فردي وده لږ وه؛ خو د نباتاتو حاصل په واحد سطحه کې زیات وو. د سرو مُلیو پر وده او حاصل باندي د نباتاتو لوړوالی، وده او همدارنگه د حاصل اندازه په ورځو کې غوره اغېزې لرلي چې په ټولو شاخصونو کې د فبروري میاشت یا وختي کرنه نباتاتو کې A2 20 x 45 سانتي متره فاصله کې د پام وړ زیاتوالی تر سترگو سو نسبتاً د مارچ میاشتي یا ناوخته کرني ته په ټولو شاخصونو کې تر نورو چلندونو نسبتاً ښه نتیجه ورکړې وه.

راني او ملگرو یې د سرو ملیو په وده او حاصل باندي په Raised Beds کې څېړنه ترسره کړل چې د نباتاتو ترمنځ پراخه فاصله (15 x 15 سانتي متره) د نبات لوړوالي، د پاڼو سطحې، د رېښې قطر، او کلوروفیل منځپانگې تر ټولو لوړ ارزښتونه ورکړل چې دا د هر یوه نبات غوره وده ښيي او همدارنگه په نږدې فاصله (5 x 5 سانتي متره) په Raised Beds شکل باندي د پاڼو تر ټولو ډېر شمېر او تر ټولو زیات مجموعي حاصل (78.61 کوبنټله في هکتار) ترلاسه سوی وو، ځکه چې په یوه ساحه کې زیات نباتات ځای پر ځای کېږي، که څه هم هر نبات کوچنی وي (Rani et al., 2010; BBS, 2000).

که سرې مُلی وختي وکرل سي يعني د سپټمبر میاشتي په وروستيو يا د اکتوبر میاشتي په شروع کې او تر منځ یې منځنۍ فاصله د 10 څخه تر 20 سانتي متره شاوخوا وټاکل سي نو هم به ښه وده وکړي او هم به ښه حاصل ورکړي او که چيري د نوموړي اندازې څخه فاصله زیاته سي نو د هرې رېښې اندازه به غټه سي، چې په مجموع کې به ټول حاصل کم سي خو که چيري نوموړي اندازې او د کرلو وخت د سيمي اب و هوا او سرو مُلیو نوعي

ته په کتو سره انتخاب کړل سي نو نتيجه به يې لا هم ښه وي (Alam et al., 2015; Hazra & Som, 1999) په هندوستان هيواد کي د سرو مټيو په وده او حاصل باندې د کرلو مختليني نېټې (د اکتوبر لومړۍ، د اکتوبر پنځلس، د نومبر لومړۍ او د نومبر پنځلس) او همدارنگه د کتارونو په مختلينو فاصلو کي (10x45، 20x45 او 30x45) څېړنه ترسره کړې چې دنوموړي څېړني پايلي دا وښودل چې د اکتوبر مياشتي لومړۍ نېټه + د بوټو نژدې فاصله (10x45 سانتي متره) کښي تر ټولو غوره حاصل ورکړی و (Anon et al., 2007; Absar & Siddique, 1982).

پايله

د فبروري د مياشتي پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کي د لوړ حاصل اندازه (2.887) کيلو گرامه په A2 20 45X سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي ورپسې د پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کي د فبروري او مارچ د مياشتي دوهمه اندازه حاصل چې د حاصل اندازه يې (2.573) کيلو گرامه ده په A1 10x45 سانتي متر فاصله کي لاس ته راغلي دي. د فبروري او مارچ د مياشتي پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کي لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (16.550) سانتي متره په A2 20 x 45 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي ورپسې په ورته مياشت او ورځو کي په دوهمه اندازه لوړ قد لرونکي نباتات چې په اوسط ډول يې د قد اندازه (15.860) سانتي متره په A1 10 x 45 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي.

د فبروري او مارچ د مياشتي پنځه پنځوس (55) ورځو په موده کي زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چې د پانيو شمېر يې په اوسط ډول سره (9.490) پاني په A2 20 x 45 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي، ورپسې په ورته مياشت او ورځو کي په دوهمه اندازه زيات شمېر پاني لرونکي نباتات چې د پانيو شمېر يې په اوسط ډول سره (7.330) پاني په A1 10 x 45 سانتي متره فاصله کي لاسته راغلي دي چې په ټولو شاخصونو کي د فبروري د مياشتي په نباتاتو کي A2 20 x 45 سانتي متره فاصله کي د پام وړ زياتوالی تر سترگو سوی نسبتاً مارچ د مياشتي نباتاتو او عيني فاصلو ته.

سپارښتني

1. بزگران کولای سي چې د سرو مټيو کښت د کال د نورو مياشتو په پرتله د فبروري په مياشت کي وکړي ځکه چې غوره وخت يې هم دا گڼل سويدي.
2. بزگران دي د سرو مټيو د کښت غوره فاصله 20 x 45 انتخاب کړي ځکه چې همدا يې غوره فاصله ښودل سوي ده.
3. دولت، تجاران او خصوصي سکتور بايد د سبو لپاره معياري ذخيره خاني جوړي کړي.
4. دولت او خصوصي سکتور بايد د کروندگرو د حاصلاتو لپاره داخلي او خارجي بازار پيدا کړي ترڅو کرونده گر ښه عايد ترلاسه کړي.

5. فني او مسلکي کسان بايد کروندگرو ته د سرو مليو او نورو سبو په روزنه کي د قيق او گټور معلومات ارايه کړي.

6. مسلکي او فني کسان بايد د کروندگرو لپاره روزنيز پروگرامونه او مرکزونه جوړکړي ترڅو کروندگر وکولای سي چي د سبو کښت، کرنيزي عمليې، حاصل ټولونه او همدارنگه د پروسيس مرحلې په صحيح ډول زده کړي.

اخځليکونه

- Absar, M. N., & Siddique, M. A. (1982). Influence of planting density on the yield of radish. *Bangladesh Journal of Agriculture*, 1(1), 23–31.
- Ahmad, M., Khan, M. A., & Ullah, R. (2018). *Effect of sowing time on the growth and yield of radish (Raphanus sativus L.)*. *Journal of Horticultural Research*, 26(3), 45-52.
- Alam M, Khairul AM, & Nuruzzaman. Effect of sowing time on growth and yield of three radish varieties. *Bangladesh Research Publications Journal*, 2010; 3(3):998-1006.
- Alam, M. K. & Farooque, A. M. (2013). Effect of sowing time on growth and yield of radish (*Raphanus sativus L.*) varieties. *Bangladesh Res. Pub. J*, 4(3), 798-989.
- Alam, M. M., & Hossain, M. A. (2015). *Effect of plant spacing and sowing time on radish root yield*. *Bangladesh Journal of Agricultural Research*, 40(1), 25-34.
- Anon. *Indian Horticulture Database www.nhb.gov.in. 2007*
- BBS, (2000). Yearbook of Agricultural statistics of Bangladesh Bureau of statistics Ministry of Planning, Dhaka. 94-102.
- Becker. G. (1962). *Handbush der pflanzenzuchtung*. 6:233-78.
- Hazra P, Som MG. Technology for vegetable production and improvement. Naya prakash, *Calcutta 1999*, 9.
- Hussain, M. M., M.A Rahim & A. Siddique. 1985. Effect of Plant Spacing and Different Levels of N-K fertilizers on the Yield of Radish. *Bangladesh J Agron*. 9 (4): IS-18.
- Lavanya, A. V. N., Vani, V. S., Reddy, P. S. S., & Chaitanya, K. (2017). Effect of sowing dates and spacing on growth and root yield of radish cv. pusa chetki. *Int. J Pure App. Bio Sci*, 5(4), 1774-1779
- Rani, M. S. (2010). *Vegetable Crop Production*. National Book Foundation, Islamabad.
- Sahu, G., Singh, V. K., & Singh, T. (2018). Effect of sowing dates and plant spacing on growth and yield of Radish (*Raphanus sativus L.*). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7(1S), 546-548.
- Sandipan, T. S., & Rawat, M. (2020). Effect of different sowing dates and spacing on the growth and yield of radish-A review. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 9(6), 1713-1716 .
- Sharma, P., & Mehta, R. S. (2020). *Influence of spacing on root yield and quality of radish*. *International Journal of Agricultural Sciences*, 12(4), 235-240.

Effect of Plant Spacing and Planting Time on the Growth and Yield of Red Radish

Muhibullah Faizi^{1*}, Farid Ahmad Wali¹, Naqibullah Mujadidi¹, Najibullah Mujadadi¹, Siddiqullah Ehsas¹, Rahimullah Himatkhwah¹, Zahidullah Arian¹, Enayatullah Muhammadi¹

¹Department of Horticulture, Faculty of Plant Sciences, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: muhib.mfms@gmail.com

Abstract

Since Afghanistan is an agricultural country, and due to its geographical location and favorable climatic conditions, it provides excellent opportunities for the growth and production of various crops. The existence of diverse terrains, including both highlands and lowlands, allows for a wide range of microclimates, making the country particularly suitable for the cultivation of vegetables, fruits, and ornamental plants. Taking advantage of these favorable natural conditions, this scientific research was conducted. This study was carried out at the research farm of the Horticulture Department, Faculty of Plant Sciences, Afghanistan National Agriculture and Technology University. The experiment was laid out in a Randomized Complete Block Design (RCBD), six treatments, and three replications. The objective of this research was to study the effect of planting time and plant spacing on the growth and yield of radish (*Raphanus sativus* L.). Two different sowing dates were selected: February 16 and March 2. Additionally, three different spacings between plants were used: 45×10 cm, 45×20 cm, and 45×30 cm. According to the results, the most favorable sowing time was mid-February, and the best spacing was 45×20 cm, which gave the highest yield, taller plants, and greater leaf number. Although the March sowing also produced acceptable results, they were relatively less effective than February. Due to decades of war and instability, Afghanistan's agriculture sector has been significantly damaged. Among the different vegetable crops, radish holds a special position due to its nutritional and economic importance. Therefore, the Horticulture Department considered it valuable to conduct this research under the title: "Effect of Planting Time and Spacing on the Growth and Yield of Radish.

Keywords: Growth, Planting Time, Radish, Spacing, Yield

د سويابينو پر حاصل باندي د فاسفورس د بېلابېلو اندازو د اغيزو ارزيايي کول

نعمت الله دانش¹، خليل الله زريال¹، قدرت الله احسان¹

¹اگرانومي څانگه، نباتي علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان

*د مسؤل ليکوال ايميل ادرس: qudrat.ehsan@gmail.com

لنډيز

د نړۍ د نفوس د چټک زياتوالي او د غذايي موادو د تقاضا د لوړوالي له امله، د کرنيزو محصولاتو د کميت او کيفيت لوړول يوه اساسي اړتيا گرځېدلې ده. سويابين د لوړ پروټين او غوړيو له امله يو مهم غذايي او صنعتي نبات دی چې د انسان او حيواني تغذيې په برخه کې ځانگړی ارزښت لري. د دې مقالې موخه د سويابين پر حاصل باندي د فاسفورس د اغېزو علمي ارزونه ده. په دې مروري مقاله کې معلومات د معتبرو نړيوالو سازمانونو او علمي څېړنو څخه راټول شوي دي. د شته مطالعاتو پايلې ښيي چې فاسفورس د ريښو په وده، گل نيونه، دانو په جوړښت او عمومي حاصل کې مهم رول لري. همدارنگه څرگنده شوې چې د فاسفورس مناسبه اندازه (شاوخوا 75-90 کيلوگرامه په هکتار کې) کولی شي د حاصل کميت او کيفيت دواړه ښه کړي. سره له دې، د بېلابېلو اقليمي شرايطو او د خاورې د ډولونو له مخې د فاسفورس د دقيقې اندازې په اړه لا هم څېړنيزې تشې موجودې دي. له همدې امله سپارښتنه کېږي چې په راتلونکو څېړنو کې د سيمې له شرايطو سره سم د فاسفورس د مديريت اغېزمن سيستمونه وازمويل شي، ترڅو د سويابين پايدار او لوړ حاصل تضمين شي.

کلیدي کلیمې: ارزښت، حاصلات، سويابين، فاسفورس، وده

سریزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله واصحابه اجمعين .

دا چې د نړۍ نفوس مخ پر زیاتیدو دي نو د دغه زیاتیدونکي نفوس د غذايي اړتیاوو د پوره کولو لپاره لازمه ده، چې د خوراكي محصولاتو په کمیت او کیفیت کي لوړوالی رامنځته شي. د لوړ او ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره، د اصلاح شویو تخمونو، مناسبو کرنیزو عملیو او د کیمیاوي سرو متوازن استعمال مهم رول لري. افغانستان یو کرنیز هېواد دی چې د نفوس ډېره برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوخته ده او د همدې سکتور له لارې خپل د ژوند اړتیاوې په مستقیم او غیر مستقیم ډول پوره کوي. غلې دانې او حبوبات د افغانستان له مهمو کرنیزو نباتاتو څخه شمېرل کېږي، چې په نړیواله کچه هم په پراخه پیمانه کرل کېږي. حبوبات د پروتین له پلوه د نورو نباتاتو په پرتله غني دي او بېلابېل ډولونه لري. له دغو څخه سویایین (*Glycine max L.*) د لوړ پروتین او غوړیو له امله لوړ غذايي ارزښت لري، چې له همدې کبله یې د کرنې د متخصصینو او صنعتي سکتور پام ځانته اړولی دی. (Ehsan et al., 2017)

سویایین اصلاً د ختیځې اسیا له سیمو څخه سرچینه اخلي او د Leguminosae (Fabaceae) کورنۍ پورې اړه لري. د دې نبات نړیوال تولید د 2024/2023 کال په جریان کې شاوخوا 395.91 میلیونه ټنه اټکل شوی، چې تر ټولو زیات تولید یې په برازیل (39% چې تقریباً 153 میلیونه ټنه کیږي)، متحده ایالاتو (29% چې تقریباً 113 میلیونه ټنه کیږي) او ارجنټاین (13% چې تقریباً 50 میلیونه ټنه کیږي) کې متمرکز دی. په داسې حال کې چې چین او هند هم د مهمو تولیدوونکو هېوادونو له ډلې څخه شمېرل کېږي (USDA Foreign Agricultural Service, 2024).

سویایین د لوړ غذايي ارزښت لرونکی نبات دی چې د خوراكي موادو په تولید او صنعتي موخو لپاره کارول کېږي. د دې دانې په ترکیب کې شاوخوا 40% لوړ کیفیت پروتین، 20% غوړي، 25-30% کاربوهایډرېټونه او 4-5% منرالونه شامل دي (Choudhary et al., 2015). سربېره پردې، سویایین د لیګومي نباتاتو په توګه د هوا څخه د نایتروجن د نسبيدو وړتیا لري، چې اندازه یې له 50 څخه تر 300 کیلوګرامه په هکتار پورې رسېږي او دا وړتیا د واریټي، اقلیم، کرنیزو کړنو او د رایزوییم بکټریا په ډول پورې اړه لري (Keyser & Li, 1992).

فاسفورس د نباتاتو د ودې او پرمختګ لپاره یو اساسي غذايي عنصر بلل کېږي په ځانګړي ډول د ودې په لومړیو مرحلو کې مهم رول لري. په لیګومي نباتاتو لکه سویایین کې، فاسفورس د نایتروجن د جذبیدو، ناډیولونو د جوړېدو او د ریسو د ودې لپاره اړین دی. د فاسفورس کمښت د ناډیولونو په جوړېدو او د نایتروجن په جذب کې کموالی رامنځته کوي. (Kamara et al., 2008; Islam & Safdar, 2009)

همدارنګه د فاسفورس مناسب استعمال د سویایین د غوړیو او پروتین په زیاتوالي او د حاصلاتو په ښه والي کې مهم رول لري (Islam et al., 2004; Lluch et al., 1983). راپورونه ښيي چې د سویایین په نبات کې له 60% څخه زیات فاسفورس د پلي جوړښت او تخمونو په تولید کې مصرفیږي (Usherwood, 1998). د

ځاورې د فاسفورس کمښت د نايټروجن جذب محدودوي، ځکه چې دا د رايډو بکټرياو او کوربه نبات په وده منفي اغېزه کوي (Martins et al., 2017). له همدې امله، د فاسفورسي سرو مناسب استعمال کولی شي د نايټروجن جوړښت، د ريښو بايومس او د دانې حاصل زيات کړي.

په همدې اساس، دا مقاله د سويابين پر حاصل د فاسفورس د بېلابېلو اندازو د اغېزو ارزونه کوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره د نړۍ له معتبرو علمي ژورنالونو څخه استفاده شوې ده، ترڅو د سويابين د اعظمي حاصل لپاره د فاسفورس مناسبه اندازه وټاکل شي.

په سويابينو کې د فاسفورس فزيولوژيک رول، د ځاورې ډول او فاسفورس

فاسفورس د سويابين د ودې، پرمختگ او حاصل لپاره يو اساسي غذايي عنصر گڼل کيږي، چې د انرژۍ د انتقال، د ريښو د ودې، د نايټروجن د جوړېدو او د دانو په توليد کې مهم رول لري. د فاسفورس مناسب مقدار کولی شي د سويابين د حاصل کميت او کيفيت دواړه ښه کړي، په داسې حال کې چې د دې عنصر کمښت يا زياتوالی د نبات په وده منفي اغېزه لري.

د بېلابېلو څېړنو پایلې ښيي چې د فاسفورس زياتوالی تر يوې ټاکلې اندازې پورې د سويابين حاصل زياتوي. د بېلگې په توگه، په کندهار کې ترسره شوې څېړنه څرگندوي چې د 75 کيلوگرامه فاسفورس په استعمال سره د دانې حاصل تر اعظمي کچې (2.47 ټنه/هکتار) رسېدلی، چې دا اندازه د 60 کيلوگرامه فاسفورس سره نږدې ورته پایله لري (Wasifhy et al., 2022). ورته پایلې د پروپو (biomass) په حاصل کې هم مشاهده شوې، چې د فاسفورس د زياتوالي سره تر يوې مشخصې کچې پورې زياتوالی موندلی دی (اول جدول).

1- جدول: د سويابينو پر حاصلاتو د فاسفورس د مختلفو اندازو اغېزې

Treatment (د فاسفورس اندازې)	Seed yield t ha ⁻¹ (د دانې توليد ټن په هکتار)	Straw yield t ha ⁻¹ (د پروپ توليد ټن په هکتار)	Biological yield t ha ⁻¹ (ټول توليد ټن په هکتار)
0 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	1.63	3.73	5.36
15 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	1.79	3.93	5.72
30 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.09	4.11	6.20
45 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.23	4.44	6.67
60 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.40	4.93	7.33
75 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.47	5.21	7.68
SEM±	0.09	0.22	0.24
LSD (p=0.05)	0.26	0.65	0.73

همدارنگه، نورو څېړنو ښودلې چې د 90 کيلوگرامه فاسفورس په استعمال سره د دانې حاصل تر ټولو لوړ (5.15 ټنه/هکتار) ترلاسه شوی، په داسې حال کې چې کنټرول پلاټ تر ټولو ټيټ حاصل (3.83 ټنه/هکتار) ثبت کړی دی (Mahmoodi et al., 2013). دا زياتوالی د پلو (pods) په شمېر او په هر پلو کې د دانو د شمېر له زياتوالي سره تړاو لري (دويم جدول)

Treatment (د فاسفورس اندازې)	Number of pods plant ⁻¹ (په یو نبات کې د پليو شمیر)	Number of seed plant ⁻¹ (په یو نبات کې د دانو شمیر)	Seed yield t ha ⁻¹ (د دانې تولید ټن په هکتار)
0 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	52.02	91.70	3.83
30 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	55.72	98.83	4.01
60 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	62.36	113.19	4.49
90 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	66.30	129.97	5.15
C.V.	11.85	11.03	12.27

سربېره پر دې، ځینې څېړنې څرگندوي چې د فاسفورس ډېر لوړ مقدار ممکن د کمېدو لامل شي. د بېلگې په توگه، د 80 کیلوگرامه فاسفورس په استعمال سره اعظمي حاصل (3.01 ټنه/هکتار) ترلاسه شوی، خو د 115 کیلوگرامه فاسفورس په استعمال سره حاصل بېرته کم شوی (Khanam et al., 2016). دا نښې چې د فاسفورس مناسب حد ټاکل د اعظمي حاصل لپاره ډېر مهم دی (دریم جدول).

3-جدول: د سویابینو پر حاصلاتو د فاسفورس د مختلفو اندازو اغیزې

Treatment (د فاسفورس اندازې)	Seed yield t ha ⁻¹ (د دانې تولید ټن په هکتار)	Straw yield t ha ⁻¹ (د پروړ تولید ټن په هکتار)	Biological yield t ha ⁻¹ (ټول تولید ټن په هکتار)
0 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.06	2.94	5.00
46 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.59	2.97	5.56
80 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	3.01	3.21	6.22
115 kg P ₂ O ₅ ha ⁻¹	2.49	3.13	5.62
SEm±	0.15	0.17	0.27
C.V.	20.83	18.76	16.27

مناقشه

فاسفورس د سویابین په وده، حاصل او د حاصل په کیفیت کې بنسټیز رول لري، او د دې عنصر مناسب مقدار کولی شي د نبات فیزیولوژیک فعالیتونه، د ریښو وده، او د نایټروجن جوړښت ته وده ورکړي. د دې مطالعې او اړوندو څېړنو پایلې نښې چې د فاسفورسي سرو استعمال د سویابین د دانې او پروړو په حاصل کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته کوي، خو دا زیاتوالی تر یوې ټاکلې اندازې پورې محدود وي.

د بېلابېلو څېړنو پایلې یو له بل سره همغږي نښې. د بېلگې په توگه، د Wasifhy او همکارانو (2022) موندنې څرگندوي چې د 75 کیلوگرامه فاسفورس په استعمال سره د دانې او پروړو حاصل په احصایوي ډول زیات شوی، چې دا زیاتوالی د کنټرول او ټیټو اندازو په پرتله څرگند دی. ورته پایلې د Aziz او همکارانو (2016) لخوا هم راپور شوي، چې د منځني کچې فاسفورس (شاوخوا 45 کیلوگرامه/هکتار) استعمال یې د حاصل په زیاتوالي کې مؤثر بللی دی.

همدارنگه، د Mahmoodi او همکارانو (2013) څېړنه ښيي چې د فاسفورس لوړ مقدار (90 کيلوگرامه/هکتار) کولی شي د دانې حاصل تر لوړې کچې ورسوي، چې دا زیاتوالی تر ډېره د پلو (pods) په شمېر او په هر پلو کې د دانو د شمېر له زیاتوالي سره تړاو لري. ورته موندنې د Dhage او همکارانو (2014) لخوا هم تایید شوي، چې د پرورو اعظمي حاصل یې د همدې کچې فاسفورس په استعمال سره ترلاسه کړی دی.

سره له دې، د Khanam او همکارانو (2016) پایلې څرگندوي چې د فاسفورس ډېر لوړ مقدار ممکن د حاصل د کمېدو لامل شي. د دوی د څېړنې له مخې، که څه هم د 80 کيلوگرامه فاسفورس په استعمال سره اعظمي حاصل ترلاسه شوی، خو د 115 کيلوگرامه په استعمال سره حاصل بېرته کم شوی دی. دا ښيي چې د فاسفورس زیاتوالی له ټاکلې کچې وروسته منفي اغېزې لرلی شي، چې ښايي د غذايي عناصرو د عدم توازن له امله وي. په تولید ډول، د یادو موندنو پر بنسټ ویل کېدای شي چې د سویابین د اعظمي حاصل لپاره د فاسفورس مناسب او متوازن مقدار ټاکل اړین دی، ځکه چې هم کمښت او هم زیاتوالی یې د نبات په وده او حاصل منفي اغېزه کولی شي.

پایله

د بېلابېلو څېړنو پایلې څرگندوي چې فاسفورس د سویابین په وده، حاصل او د حاصلاتو په کیفیت کې مهم رول لري. د دې عنصر مناسب مقدار کولی شي د دانې او پرورو حاصل په معنی دار ډول زیات کړي. پایلې ښيي چې د 75-90 کيلوگرامه فاسفورس په هکتار کې استعمال د سویابین د اعظمي حاصل د ترلاسه کولو لپاره مناسب دی. په هر حال، د فاسفورس له دې کچې څخه زیات استعمال ممکن د حاصل د کمېدو لامل شي، لکه څنگه چې په ځینو څېړنو کې د 115 کيلوگرامه فاسفورس په استعمال سره د حاصل کمښت مشاهده شوی. (Khanam et al., 2016) له همدې امله، د فاسفورس متوازن او هدفمند استعمال د سویابین د پایدار تولید لپاره اړین دی.

سپارښتني

1. د سویابین کرونيکي باید د فاسفورس مناسب مقدار د علمي لارښوونو پر بنسټ وکاروي.
2. د فاسفورس اندازه باید د خاورې د حاصلخیزۍ، اقلیمي شرایطو او سیمه ییزو ځانگړتیاوو له مخې تنظیم شي.
3. د 75-90 کيلوگرامه فاسفورس په هکتار کې استعمال د حاصل د زیاتوالي لپاره مناسب گڼل کېږي.
4. د فاسفورس له زیات استعمال څخه باید ډډه وشي، ځکه چې لوړ مقدار یې د حاصل په کمېدو منفي اغېزه کولی شي.
5. د فاسفورس ترڅنگ د نورو غذايي عناصرو لکه نایټروجن او پوتاشیم متوازن استعمال هم ضروري دی.
6. د مختلفو سیمو لپاره د فاسفورس د مناسبې کچې د ټاکلو په موخه لا زیاتو څېړنو ته اړتیا شته.

- Aziz, A., Ahiabor, B., Opoku, A., & Abaidoo, R. (2016). Contributions of rhizobium inoculants and phosphorus fertilizer to biological nitrogen fixation, growth and grain yield of three soybean varieties on a fluvic luvisol. *American Journal of Experimental Agriculture*, 10(2), 1-11.
- Choudhary, A. K., Rana, D. S., Bana, R. S., Pooniya, V., Dass, A., Kaur, R., & Rana, K. S. (2015). Agronomy of oilseed and pulse crops. *Post Graduate School, IARI, New Delhi and ICAR, DARE, New Delhi, India*, 218.
- Dhage, S. J., Patil, V. D., & Dhamak, A. L. (2014). Influence of phosphorus and sulphur levels on nodulation, growth parameters and yield of soybean (*Glycine max* L.) grown on Vertisol.
- Ehsan, Q., Rana, D. S., & Choudhary, A. K. (2017). Productivity and resource-use efficiency of greengram (*Vigna radiata*) as influenced by sowing methods and phosphorus levels under semi-arid conditions of Afghanistan. *Indian Journal of Agronomy*, 62(3), 367-370. <https://www.fas.usda.gov/data/commodities/soybeans>
- Islam, M. K., Mondal, M. A. A., Mannaf, M. A., Mondal, M. A. A., Talukder, M. A. H., & Karim, M. M. (2004). Effects of variety, inoculum and phosphorus on the performance of soybean.
- Islam, M., & Safdar, A. (2009). Effect of integrated application of sulphur and phosphorus on nitrogen fixation and nutrient uptake by chickpea (*Cicer arietinum* L.). *Agrociencia*, 43(8), 815-826.
- Kamara, A. Y., Kwari, J., Ekeleme, F., Omoigui, L., & Abaidoo, R. (2008). Effect of phosphorus application and soybean cultivar on grain and dry matter yield of subsequent maize in the tropical savannas of north-eastern Nigeria. *African Journal of Biotechnology*, 7(15).
- Keyser, H. H., & Li, F. (1992). Potential for increasing biological nitrogen fixation in soybean. In *Biological Nitrogen Fixation for Sustainable Agriculture: Extended versions of papers presented in the Symposium, Role of Biological Nitrogen Fixation in Sustainable Agriculture at the 13th Congress of Soil Science, Kyoto, Japan, 1990* (pp. 119-135). Springer Netherlands.
- Khanam, M., Islam, M. S., Ali, M. H., Chowdhury, I. F., & Masum, S. M. (2016). Performance of soybean under different levels of phosphorus and potassium. *Bangladesh Agronomy Journal*, 19(1), 99-108.
- Lluch, C., Campos, J. A., & Ligeró, F. (1983). Effect of nitrogen and sulphur fertilizers and seed inoculation with rhizobium phaseoli on the nitrogen-sulphur relationships of bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Journal of plant nutrition*, 6(12), 1033-1042.
- Mahmoodi, B., Mosavi, A. A., Daliri, M. S., & Namdari, M. (2013). The evaluation of different values of phosphorus and sulfur application in yield, yield components and seed quality characteristics of soybean (*Glycine Max* L.). *Advances in Environmental Biology*, 7(1), 170-176.
- Martins, D., Macovei, A., Leonetti, P., Balestrazzi, A., & Araújo, S. (2017). The influence of phosphate deficiency on legume symbiotic N₂ fixation. *Legume Nitrogen Fixation in Soils with Low Phosphorus Availability: Adaptation and Regulatory Implication*, 41-75.
- Usherwood, N. R. (1998). Nutrient management for top-profit soybeans. www.ppi-ppic.org. verified 2/15/14.
- Wasifhy, M. K., Raihan, O., Pooniya, V., Kumar, A., Verma, A. K., Stori, R. M., & Biswakarma, N. (2022). Influence of phosphorous fertilization on productivity of soybean in Kandahar, Afghanistan. *Annals of Agricultural Research*, 40(3), 261-266.

Effect of Phosphorus levels on yield of Soybean (*Glycine max* L.)

Niamatullah Danesh¹, Khalilullah Zaryal¹, Qudratullah Ehsan^{1*}

¹Department of Agronomy, Faculty of Plant Sciences, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: qudrat.ehsan@gmail.com

Abstract

Due to the rapid growth of the global population and the increasing demand for food, improving the quantity and quality of agricultural products has become a fundamental necessity. Soybean is an important food and industrial crop because of its high protein and oil content, playing a significant role in both human and animal nutrition. The objective of this review article is to evaluate the effects of phosphorus on soybean yield. In this review, information was collected from reputable international organizations and scientific studies. The findings indicate that phosphorus plays a crucial role in root development, flowering, seed formation, and overall yield of soybean. It has also been observed that an optimal phosphorus application rate (approximately 75–90 kg ha⁻¹) can significantly improve both yield quantity and quality. However, there are still research gaps regarding the precise phosphorus requirements under different climatic conditions and soil types. Therefore, further studies are recommended to develop effective phosphorus management strategies tailored to local conditions in order to ensure sustainable and high soybean production.

Keywords: Growth, Phosphorus, Soybean, Value, Yield

د کروند گرو پر توليد د کرنيزي تکنالوژۍ اغيزې (د کندهار ولايت پنجوايي

(ولسوالۍ)

- اسدالله سعادت¹، شجاع محمد کاکړ²، عبدالهادي واصل¹، سردارولي شيرزاد³، سيد محمد کبير مين⁴
- ¹د کرنيزي توسعې خانگه، د کرنيز اقتصاد او توسعې پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان
- ²کرنيز مارکيټينگ خانگه، د کرنيز اقتصاد او توسعې پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان
- ³د کرنيز اقتصاد او توسعې خانگه، د کرنيز اقتصاد او توسعې پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان
- ⁴د کرنيز اقتصاد خانگه، د کرنيز اقتصاد او توسعې پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان

* د مسؤل ليکوال اي ميل ادرس: shujakakar5@gmail.com

لنډيز

کرنيزه تکنالوژي د کرنيزو ماشينونو، وسايلو او عصري فعاليتونو ټولگه ده، دې تکنالوژۍ د کرنيزو محصولاتو توليد لوړ کړی، د کروند گرو فعاليتونه ئې اسانه کړي او د حاصلاتو د زياتوالي له لاري يې د کروند گرو اقتصادي ثبات تأمين کړی دی. دا يو ساحوي څيړنه ده، چي د کندهار ولايت د پنجوايي ولسوالۍ په څو لويو کلیو کي ترسره سوې، معلومات يې د پوښتنپاڼي له لاري د هغو کروند گرو څخه راټول سوي چي په خپلو کروندو کي يې د کرنيزي تکنالوژۍ څخه استفاده کول، يادي کورنۍ چي دقيق شمير يې (60) ته رسيدې، د يمني فورمول څخه په استفادې سره (52) کورنۍ د معلوماتو د راټولولو لپاره په تصادفي ډول انتخاب سول، معلومات يې د (Friedman Test) له لاري تحليل سوي، چي موخه يې د کروند گرو پر توليد باندي د کرنيزي تکنالوژۍ د اغيزو معلومول دي. د څيړني پايلي ښيي چي د کرنيزي تکنالوژۍ استعمال د کروند گرو په توليد کي مثبت رول لري، کرنيزه تکنالوژي د کرنيز سکتور په پرمختگ کي مهم نقش لوبوي. څيړنه تکنالوژۍ ته د آسانتياوو لاسرسی، د تکنالوژۍ د منلو اړوند روزنيز پروگرامونه، عملي استعمال او د کرنيزو آفاتو او امراضو په کنترول کي د تکنالوژۍ څخه استفاده وړانديز کوي.

کلیدي کليمي: پنجوايي ولسوالۍ، کرنه، کرنيزه تکنالوژي، کروند گر، کندهار

سريزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين.

کرنيزه تکنالوژي د کرنيزو ماشينونو، تجهيزاتو او پرمختللو کرنيزو تخنيکونو مجموعه ده، دې تکنالوژۍ په تيرو څو لسيزو کې د کرنيزو محصولاتو تولید لوړ کړی او د کروندگرو فعاليتونه يې اسان کړي دي، دا تکنالوژي د تولید پروسې ساده کوي او د حاصل د زياتوالي، د لگښتونو د کميدو او د وخت د سپما لامل گرځي، د تکنالوژي استعمال په ځانگړي توگه په پرمختللو هيوادونو کې د کرنيز سکتور د تولید د لوړتيا او کيفيت د لوړوالي لپاره مهم گڼل کيږي، په دې تخنيکونو کې اتوماتيک ماشينونه، د اوبو لگولو پرمختللي سيستمونه، د هوا د څار، د خاوري د تحليل وسايل او همدارنگه د اصلاح شويو تخمونو کارول شامل دي (FAO, 2020).

کروندگر هغه چاته ويل کيږي چې د ځمکې د کرلو، د کښت کولو او د زراعتي محصولاتو د تولید او روزني مسؤليت پر غاړه لري، کروندگر د کرنې په بيلابيلو برخو کې کار کوي، لکه د کښت روزنه، د حيواناتو پالنه او د محصولاتو تولونه چې دا د اقتصاد په برخه کې هم مهم رول لوبوي، ځکه چې کرنه د خوراكي موادو د تولید لومړني توليدونکي دي (FAO, 2022). کرنه زموږ د هيواد د اساسي توليدي منبع څخه گڼل کيږي زموږ د هيواد زيات نفوس په کرنه بوخت، د وگړو زياته برخه په کليو کې اوسيږي، ننۍ نړۍ د تکنالوژي له پراخ پرمختگ سره مخ شوې ده، تکنالوژي په کرنه کې اساسي بدلونونه راوستلي دي، چې د کروندگرو تولید يې زيات کړی او د هغو لگښتونه يې کم کړي دي، دا پرمختگونه په ځانگړي توگه د پرمختللو وسايلو او ميتودونو لکه د ماشينونو، د اوبو لگولو سيستمونو او د عصري تخنيکونو په مرسته ترلاسه شوي دي (Kassem, 2019).

د کرنيزي تکنالوژي د پراختيا له کبله د دوديزو کرنيزو تخنيکونو پر ځای پرمختللي ميتودونه ځای نيسي، دوديزي طريقي زيات کاري ځواک او وخت مصرفوي، دوديزي کرنې د اقليمي شرايطو او ناروغيو پر وړاندې کمزوري تگلاري دي، په داسې حال کې چې کرنيزي تکنالوژي، د کرنې د دې ډول ستونزو لپاره حل لاره وړاندې کړی دی، د اوبو لگولو د عصري سيستمونو لکه قطره يی او Spray سيستمونو پرمختگ د اوبو د سپما او د حاصلاتو د کيفيت په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی همدارنگه د اصلاح شويو تخمونو او نباتاتو کارول د ناروغيو او اقليمي بدلونونو پر وړاندې مقاومت لري، چې د کروندگرو د حاصلاتو د زياتيدو سبب کيږي (Evenson and Gollin, 2003). پرمختللي تکنالوژي په ځانگړې توگه د خوراكي خونديتوب په تأمين او د نړيوال خوراكي بحران په حل کې رغنده رول لوبوي، د بېلابېلو هيوادونو تجربو بنودلي چې تکنالوژي د کرنې په سکتور کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي، چې نه يوازې په اقتصادي لحاظ گټور دي، بلکې ټولنيز او چاپيريالي اغيزې هم لري (Kassem, 2019). که څه هم کرنيزه تکنالوژي ډېرې گټې لري، خو په پرمختيايي او وروسته پاتي هيوادونو کې لا هم ستونزي او ننگوني شته چې د دي تکنالوژي له بشپړ ظرفيت څخه په سمه توگه استفاده وشي، د تکنالوژي لوړ لگښتونه، د کروندگرو د پوهې او روزني نشتون، او د تخنيکي پوهې کموالی هغه عمده ستونزي دي چې د کرنيزي تکنالوژي په پراختيا کې د پرمختگ مخنيوی کوي، د دي لپاره

چې کرنيزه تکنالوژي د ټولو کروندگرو لاسرسۍ ته برابره شي، اړينه ده چې حکومتونه، نړيوالي موسسې او نور اړوند بنسټونه د تکنالوژي د پراختيا او لاسرسۍ په برخه کې لاسپټي هڅې وکړي (World Bank, 2021). د کرنيزي تکنالوژي ډولونه عبارت دي له، لومړۍ ماشينيزه تکنالوژي څخه، چې د ځمکې د کښت او حاصل ټولولو ماشينونه چې د کرنيزو کارونو په چټکتيا او اغېزمنتيا کې مرسته کوي، دوهم د اوبو لگولو تکنالوژي، لکه قطره بې او (Spray) اوبو لگولو سيستمونه چې د اوبو مصرف تنظيموي او د محصولاتو کيفيت لوړوي (Evenson and Gollin, 2003). دريم ډول بې بيا لورژيکي تکنالوژي ده چې د اصلاح شوي تخمونو او نباتاتو کارول چې د ناروغيو او اقليمې بدلونونو په وړاندې مقاومت لري عبارت دي، چې د پرمختللو تخنيکونو يوه بله مهمه برخه د جنيتيکي اصلاح شويو تخمونو کارول دي، چې د ناروغيو او اقليمې بدلونونو په وړاندې مقاومت لري، دا تخمونه په ځانگړي توگه د حاصل د خونديتوب او لوړتيا لپاره گټور گڼل کېږي، د تکنالوژي پرمختگ د کرنيزو محصولاتو په کيفيت کې هم رغنده رول لوبوي او کروندگرو ته دا توان ورکوي چې په نړيوالو بازارونو کې سيالي وکړي (Rogers, 2010). په نړۍ کې د نفوس د زياتوالي او د خوراکي توکو پر اړتياو د زياتيدو له امله، کرنه د هر هېواد په اقتصادي وده، ټولنيز پرمختگ او د خوراکي توکو د خونديتوب په تأمين کې ځانگړې اهميت لري، په دې وروستيو لسيزو کې د کرنيزي تکنالوژي پرمختگ د کرنې په سکتور کې لوی بدلونونه راوستلي دي، مناسبه تکنالوژي کروندگرو ته دا امکان برابر کړی چې په کم وخت او کم لگښت سره ډېر حاصل ترلاسه کړي او په همدې توگه بې د کرنيزو محصولاتو د توليد پروسه گټوره کړي ده، په همدې ترتيب، پرمختللي وسايل، ماشينونه، د اوبو لگولو پرمختللي سيستمونه، او د جنيتيکي اصلاح تخنيکونه د کروندگرو په فعاليتونو او د حاصلاتو په زياتوالي کې د پام وړ پرمختگونو رامنځته کړي دي (Akudugu, 2012).

د کرنيزي تکنالوژي په کارونې سره د حاصلاتو توليد او د ځمکې استعمال په مؤثره توگه لوړېدلای سي، مثلاً د جنيتيکي اصلاح سويو تخمونو کارول په مختلفو سيمو کې د حاصلاتو د زياتوالي لامل سوی، چې د غذايي امنيت په برخه کې مثبتې اغيزې لري، د زراعت لپاره د پرمختللو تکنالوژيو لکه د اوبو لگولو اتومات سيستمونو کارول هم د توليد په زياتوالي کې مرسته کوي (Evenson and Gollin, 2003).

پرمختللي تکنالوژي، لکه د اوبو لگولو پاشنده سيستمونه، چې د کروندگرو لپاره د آبيارۍ د لگښتونو په کمولو کې مرسته کوي، دا تکنالوژي د کارگرانو اړتياوې راکموي او د محصولاتو په توليد کې د زحمت او وخت د کمښت لامل کېږي، چې د کروندگرو د مالي حالت په ښه کولو کې مهمه ونډه لري (Pingali, 2012).

د کرنيزي تکنالوژي کارونه نه يوازې د حاصلاتو مقدار زياتوي، بلکې د محصولاتو کيفيت هم لوړوي، د کيفيت د ښه والي لپاره د کيمياوي سري او د آفاتو د کنترول تکنالوژي کارول د محصولات پر کيفيت باندې مثبت تاثيرات لري، پرمختللي کرنيزي تکنالوژي د سالمو او باکيفيته محصولاتو د توليد لپاره مناسب شرايط برابروي، چې د کروندگرو د عايداتو د زياتوالي لامل گرځي (Pretty, 2008).

Rogers په (2010) کې د نوښتونو منل او خپرولو تر عنوان لاندې مطالعه کړېده، پایله یې ښيي چې کرنيزي تکنالوژي د اقليم د بدلونونو په وړاندې مقاومت زیاتوي، د اوبو د سپما سیستمونه او د خاوري د ساتني تکنالوژي د اقليمي بدلون په منفي اغيزو کې کموالی راولي، دا تکنالوژي د کرنې د پایښت لپاره مهمه ده، چې د کروندگرو پر اقتصادي حالت باندې مثبت تاثیر لري (Rogers, 2010).

د کرنيزي تکنالوژي کارول د اقتصادي ودې لپاره مهمه ده، د کرنيزو تولیداتو زیاتوالی نه یوازې د کروندگرو عاید زیاتوي، بلکې د کلیوالي سیمو اقتصادي حالت هم ښه کوي، د صادراتو او داخلي مارکیټونو د تقویت لپاره د زراعت پرمختللي تکنالوژي پر اقتصادي وده باندې مثبت اغيزه لري (World Bank, 2021).

د کرنيزي تکنالوژي په کارونې سره ښځې او عمر خوړلي انسانان کولی شي د زراعت په پروسو کې فعاله ونډه ولري، د ښځو او عمر خوړلو د کارونې، هڅونې د عایداتو زیاتوالي او د کورنۍ د اقتصادي حالت په ښه کولو کې مرسته کوي (FAO, 2020).

د کوچنیو کروندگرو د تعلیم کموالی د تکنالوژۍ د قبولیت په وړاندې خنډونه ایجادوي، د کرنې د پراختیا فرصتونه د گواښ سره مخ کوي، په داسې حال کې چې د کرنيزي تکنالوژۍ منل د کرنې په پراختیا کې د مثبت بدلون په لوري چټک گامونه پورته کوي او کرڼه پایداره او عواید زیاتوي (Adnan et al., 2025).

په کرڼه کې د عصري تکنالوژۍ استعمال لکه د مصنوعي ماشینونو استعمال د کرنې د تولیداتو په کمیت او کیفیت کې ښه والی راولي، په ځانگړې توگه د فصلونو مدیریت او ناروغیو په مخنیوي کې په زیاته اندازه سره اصلاحات رامنځته کیدای شي (Hossen et al., 2023). په پرمختللو هیوادونو کې د کرنيزي تکنالوژۍ په منلو کې ترویجی روزنیز پروگرامونه مثبت واقع کېږي، د تکنالوژۍ د استعمال لپاره د کروندگرو ظرفیت لوړوي، د استعمال د مختلفو طریقو لپاره د کروندگرو ترمنځ د تجربو و شریکولو ته زمینه برابروي (Becerra-Encinales et al., 2024). دا تکنالوژي د حاصلاتو کمیت او کیفیت زیاتوي، د منابعو موثریت لوړوي او د کروندگرو عواید زیاتوي (Zaki, 2023). د انساني منابعو کمښت، د وسایلو نشتوالی او د ظرفیتونو محدود امکانات د تکنالوژي د مؤثر تطبیق مهم او لوی خنډونه دي (Singh, 2008). افغانستان د کرنيزو نوښتونو له لارې کولی شي واردات کم، تولید زیات او پر ځان بسیا کرڼه ترسره کړي، نو ویلای سو چې د ډیجیټل تکنالوژي قبولول د کروندگرو عایدات زیاتوي او د هغوي د ژوند د سطحې په لوړولو کې مرسته کوي او په کرنيزو فعالیتونو کې انساني راولي (Nasrat, 2022).

کرنیزه تکنالوژي نه یوازې د حاصلاتو د کمیت په زیاتولو کې مرسته کوي، بلکې د کار کیفیت هم لوړوي، په ډېر لږ وخت او کمه انرژي سره کروندگر کولای شي چې د ماشینونو او وسایلو په مرسته ځمکې وکړي او حاصلات ټول کړي. ولې زموږ په هیواد کې د کرنيزي تکنالوژۍ څخه څومره چې مناسب وي په هماغه اندازه سره استفاده نه کېږي، د کرنيزي تکنالوژي د پلي کولو کموالی په ځینو سیمو کې د بیلابیلو عواملو له امله دی، لکه د معلوماتو نشتون، د مالي ملاتړ کموالی او د کروندگرو د تعلیم د کچې ټیټوالی (Kahan and Arora,

(2020). د کروندگرو اقتصادي وضعيت د کرنيزي تکنالوژي پر پلي کولو او استعمال باندې اغيز لري (Abay and Hassen, 2022). په ياده برخه کې تر اوسه پوري د څېړني په ساحه کې کافي څېړني هم نه دي ترسره سوي ترڅو کروندگر په دې باندې قانع کړي چې په خپلو کرنيزو فعاليتونو کې د مناسبې کرنيزي تکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. ددې ستونزو په نظر کې نيولو سره ياده څېړنه ترسره سوي ده، چې عمومي موخه يې د کروندگرو پر توليد باندې د کرنيزي تکنالوژۍ د اغيزو معلومول دي.

مواد او کړنلاره

داڅېړنه په (1404) کال کې د افغانستان د کندهار ولايت د پنجوايي په کليوالي سيمو کې ترسره سوي ده چې د هدف له مخې تطبيقي او د معلوماتو د راټولولو له مخې ساحوي څېړنه ده، لومړني معلومات يې د پوښتنپاڼې په واسطه راټول شوي دي.

پوښتنپاڼې څو برخي درلودلې چې پر کرنيزو توليداتو باندې د تکنالوژي اغيزي، د تکنالوژي گټي، پر چاپيريال باندې د تکنالوژي اغيزي، د تکنالوژي پراختيا او حمايت او همدارنگه د تکنالوژي اړوند نوري برخي شاملې دي هره برخه يې په ښه ډول واضح سوي ده، چې په هره برخه کې په کافي اندازه سره پوښتني د ځواب ويونکو څخه شوي دي.

د پنجوايي ولسوالۍ يو شمير کلي لري، لوي کلي يې دهمراسۍ، صلاوات، سفروان، زنگي اباد، موشان، پمباسي څخه عبارت دي، د څېړني د معلوماتو د راټولولو لپاره د دغو کليو څخه د (دهمراسي، موشان او صلاوات) لوي کلي انتخاب شويدي، ځکه چې په دغه کلي کې هغه کليوال وگړي چې په همدې کلي کې د پخوا څخه اوسيري او ددې سيمي اصلي اوسيدونکي دي، او په خپلو کرنيزو فعاليتونو او کروندو کې تر زياته حده پوري د کرنيزي مناسبې تکنالوژۍ څخه استفاده کوي انتخاب سوي دي، يادې کورنۍ تر دقيقې شميرني وروسته (60) کورنيو ته رسيدلي، ددې کورنيو څخه د څېړني د لومړنيو معلوماتو د راټولولو له پاره د يمني (1967) فورمول څخه استفاده سویده (Yamane, 1967)، چې د (60) کورنيو د جملې څخه د ياد فورمول په اساس باندې (52) کورنۍ انتخاب او ياد پوښتنليکونه ورڅخه جواب او معلومات ئې راټول سويدي.

يمني فورمول

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

په پورتي فورمول کې:

- (N) د څېړني د جامعي يا نفوس اندازه ښيي
- (e) د څېړني خطا چې معمولاً (0.05) نيول کيږي.

پوښتنپاڼې د دغو کورنيو د سرپرستانو په واسطه په تصادفي ډول په مخامخ او تليفون له لاري ډکي شويدي او د (SPSS₂₆) په واسطه تحليل شوي.

د څېړني د موخو په نظر کي نیولو سره د فریدمن تحلیل (Friedman Test) ترسره سوی دئ، دا تحلیل یو غیر پارامتریک تحلیل دئ چي د درې یا زیاتو تړلو ډلو د اوسطونو د پرتله کولو له پاره کاریري. معادله یې په لاندې ډول سره ده:

$$\chi^2_F = \frac{12}{nK(K+1)} \sum R_j^2 - 3n(k+1)$$

χ^2_F = د فریدمن تحلیل

N = د متغیرونو شمېر

K = د گروپونو شمېر

R_j = د هر گروپ د رتبې مجموعه

موندني

د څېړني د معلوماتو د تحلیل څخه معلومه سول چي، د څېړني ټول ځواب ویونکي (100%) نارینه، ځوان او د ابتدائیه زده کړو درلودونکي وه. په خپلو کلیو کي د اوسیدو موده یې څه نا څه زیاته چي حد اقل د (15) کالو په شاخوا کي محاسبه سوې. یاد کروندگر د خپلي کرنيزي تکنالوژی څخه تر دریو کلونو پوري استفاده کوي. د ځواب ویونکو زیاتي برخي تائید کړې چي د کرنيزي تکنالوژی منل او استعمال د دوي د کرنيزو فارمونو عواید زیات کړي او د لوړي گټي څخه برخمن دي. د (Friedman Test) تحلیل ښيي چي د تکنالوژی څخه د استفادې له لاري د کرنيزو فارمونو مدیریت په آسانی سره ترسره کیدلای سي، په کرنيزو فارمونو کي د آفاتو او امراضو په وړاندې د مبارزې توان زیاتوي، د کرنيزو محصولاتو کیفیت لوړوي او په مجموع کي د کرنيزو فارمونو په بریالیتوب کي مهم رول لوبولای سي.

د کروندگرو د ځواب او معلوماتو په اساس په هره اندازه چي په ساحه کي مناسبې تکنالوژی ته لاسرسی زیات وي په هماغه اندازه سره ئې د استعمال کچه لوړه وي، د کرنيزي تکنالوژی په منلو کي د کروندگرو د ظرفیت لوړوني اړوند لنډمهاله او اوږدمهاله روزنيز وړیا پروگرامونه ډیر مهم رول لوبولای سي، د دولت حمایت او ملاتړ تکنالوژی ته د کروندگرو په لاسرسی کي مفید واقع کیدای سي، د تکنالوژی په اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کي انټرنیټ مؤثره واقع کیدلای سي، همدارنگه بریښنا د تکنالوژی په استعمال کي مهم نقش لوبولای سي، کرنیز ماشینونه د کرنيزو تولیداتو په زیاتوالي کي مهم رول لوبوي، نوي او اصلاح سوي تخمونه د کرنی په مقاوم کیدو کي ډیر مهم دي او مناسبه او عصري تکنالوژي د کرنيزو محصولاتو په پروسس کي د ارزښت د زیاتولو له لاري مثبت واقع سوې ده.

پر کرنيزو تولیداتو باندي د کرنيزي تکنالوژی اغيزې

ددې لپاره چي موږ ته معلومه سي چي د څېړني په ساحه کي، د مختلفو عواملو په نظر کي نیولو سره، د کرنيزو تولیداتو پر زیاتوالي باندي د کرنيزي تکنالوژی اغيزې په دقیق ډول راته معلومي سي احصائیوي تحلیل د (Friedman Test) څخه استفاده کوو. په لاندې 1 جدول کي، موږ د کرنيزو محصولاتو اړوند مختلف موارد

لرو چې مارکيټ ته لارسی، لگښتونه، بشري قوه او د نورو اړوند دي. ددې لپاره چې موږ ته معلومه کړل سي چې کرنيزه ټکنالوژي پر يادو مواردو څرنگه اغيزه کوي موږ په دې برخه کې د دې فرضيې لرو:

H_0 : کرنيزه ټکنالوژي د کرنې د پراختيا پر عواملو باندې يو ډول اغيزه کوي.

H_1 : کرنيزه ټکنالوژي د کرنې د پراختيا پر عواملو باندې يو ډول اغيزه نه کوي.

په 2.4 جدول کې د احصائويي ارقامو ($p \text{ value}=0.000$) چې تر (0.05) کم قیمت دی، داسې چې د کرنيزي ټکنالوژي استعمال د کرنيزو توليداتو د پراختيا او ښوالي سره د پام وړ او مثبتې اړیکه لري، په دې مفهوم کې د نوي او مناسبې ټکنالوژي کارونه د کرنيزو توليداتو په زیاتوالي مؤثریت او مناسب مدیریت کې مهم رول لري. د 1 جدول د رتبه ای اوسط د ارقامو څخه معلومېږي چې مارکيټ ته په لاسرسي کې کرنيزه ټکنالوژي د (3.94) قیمت په نظر کې نیولو سره په لومړي قدم کې، په کرنيزو پلانونو او تصاميمو کې د (3.71) قیمت په درلودلو سره په دوهم قدم کې او د کرنيزو فصلونو په ښوالي کې د (3.52) قیمت په درلودلو سره په دريم مقام کې ځای لري. همدارنگه د فارم د حاصل په زیاتوالي، بشري قوې او د کرنيزو لگښتونو په کمولو کې د کرنيزي ټکنالوژي اغيزي په ترتيب سره څلورم څخه تر پنځم پورې دي. د يادو قیمتونو په نظر کې نیولو سره ویلاي سو چې کرنيزه ټکنالوژي د کرنې د پراختيا پر عواملو باندې يو ډول اغيزه نه کوي، بلکه پر هر عامل باندې په ځانگړي او جلا ډول سره اغيزه کوي، په دې ترتيب د (H_0) فرضیه رد او د (H_1) فرضیه د قبول وړ ده.

1-جدول: پر کرنيزو توليداتو باندې د کرنيزي ټکنالوژي اغيزي

درجه	رتبه ای اوسط	انحراف معيار	حسابي اوسط	د کرنيزو محصولاتو اړوند موارد
1	3.94	0.72110	4.0962	د کرنيزو محصولاتو مارکيټ ته په لاسرسي کې د کرنيزي ټکنالوژي ونډه
2	3.71	1.02954	3.8654	په کرنيزو پلانونو او تصاميمو کې د کرنيزي ټکنالوژي ونډه
3	3.52	0.90478	3.7500	د کرنيز فصلونو په ښوالي کې د کرنيزي ټکنالوژي ونډه
4	3.40	1.27335	3.5769	د فارم د حاصل په زیاتوالي کې د کرنيزي ټکنالوژي ونډه
5	3.30	1.19498	3.5577	فارم د کاري بشري قوې په تشکیل کې د کرنيزي ټکنالوژي ونډه
6	3.13	1.14552	3.5385	د کرنيزو محصولاتو د توليد په لگښتونو کې د کرنيزي ټکنالوژي ونډه

$Chi\text{-Square}=7.990$

$p \text{ value}=0.000. df= 6$

د کرنيز سکټور په پرمختگ کې د کرنيزي ټکنالوژي رول

په 2 جدول کې معلومېږي چې کرنيزه ټکنالوژي د خاوري د کتنې او ازموينې د سیستمونو او د عضوي سري د تطبيق له لارې د خاوري په حاصلخيزی کې د (3.36) رتبه ای اوسط په لرلو سره په لومړي قدم کې، د اوبو د سپما او مؤثره استعمال له لارې د اوبو د منابعو په ساتنه کې په دوهم قدم کې د (3.21) قیمت په لرلو سره، په دريم قدم کې د مضرو او زهرجنو درملو په استعمال کې د (3.06) رتبه ای اوسط په لرلو سره ځای لري او په څلورم قدم کې

کرنيزه تکنالوژي د نباتي امراضو او آفاتو په پيژندنه او د هغوي په مخنيوي کي د (2.84) رتبه ای اوسط په لرلو سره د کرنيزي تکنالوژۍ استعمال د ځواب ويونکو د معلوماتو د تحليل په نتيجه کي ځاي لري.

2- جدول: د کرنيز سکټور په پرمختگ کي د کرنيزي تکنالوژۍ رول

رد شمېره	رتبه ای اوسط	انحراف معيار	حسابي اوسط	نمونه	د کرنيزي پراختيا اړوند موارد
1	3.36	1.04065	3.7692	52	د خاروي په حاصلخيزۍ کي د کرنيزي تکنالوژۍ ونډه
2	3.21	1.00226	3.7692	52	د اوبو د منابعو په ساتنه کي د کرنيزي تکنالوژۍ ونډه
3	3.06	0.99925	3.5385	52	د زهرجنو موادو د کارونې په کموالي کي د کرنيزي تکنالوژۍ ونډه
4	2.84	1.07487	3.4615	52	د کرنيزو آفتونو او ناروغيو په مخنيوي کي د کرنيزي تکنالوژۍ ونډه
5	2.54	0.96761	3.2500	52	د هوا د ککړتيا په مخنيوي کي د کرنيزي تکنالوژۍ ونډه

$Chi-Square=6.854$

$p\ value=0.000. df= 4$

مناقشه

د څيړني د موندنو او د معلوماتو د تحليل څخه معلوميري چي، کرنيزه تکنالوژي د کروند گرو د تصاميمو په نيولو او پلي کولو، د کرنيزو فصلونو په ښوالي او د بشري قوې په استخدام کي د پام وړ مثبتې اغيزې کوي، په دې مفهوم چي، کروند گر د نوي تکنالوژۍ د کارولو له لاري په اسانۍ سره د اقليمي معلوماتو، شرايطو او کرنيز تناوب په نظر کي نيولو سره خپل د خاص فصل کرنيز نباتات انتخاب او مناسب تصميم ونيسي، همدارنگه د مناسبي کرنيزي تکنالوژۍ د استعمال له لاري لکه د آبياري عصري سيستمونه، د فصلونو په ښوالي او د کرنيزو توليداتو په کيفيت کي کافي ښوالی راولي، په دې برخه کي KABATO او ملگرو يې هم په (2025) کال کي يو کتابتوني څيړنه ترسره کړيده چي داسي پايله يې په لاس ورڅخه راوړي ده، کرنيزه تکنالوژي د اقليم په اړه کافي معلومات وړاندي کوي، د کرنيزو فارمونو د اوبو لگوني او مديريت کي د پام وړ رول لري، د سري په استعمال کي مهم نقش لوبوي، د اقليم د بدلون ناوړه اغيزې تر ډيره حده پوري کموي، د چاپيريال ساتنه تضمينوي او د فصلونو په تنوع کي خاص رول لري.

د څيړنو په موندنو کي وموندل سول چي د تکنالوژۍ څخه د استفادې له لاري په کرنيزو لگښتونو کي د پام وړ کموالی راځي، که څه هم د تکنالوژۍ استعمال په لومړي قدم کي يو اندازه لگښت لري، خو په اوږدمهاله توگه د حاصلاتو د زياتوالي له لاري د لگښتونو په کموالي کي د پام وړ کموالی راولي (Geng et al., 2024) هم ورته نتيجه ته رسيدلي دي.

کرنيزه تکنالوژي د خاوري په پيژندنه او د هغې په مناسب استعمال کي مهم نقش لوبوي، دا ځکه چې د کرنيزي عصري تکنالوژي له لاري د خاوري مناسب اصلاح، ارزونه او حاصلخيزي صورت نيسي (Getahun et al., 2024).

د آبياري د عصري سيستمونو د استعمال له لاري د اوبو د منابعو منظم تنظيم او مديريت د مناسبې تکنالوژي د کارونې او استعمال له لاري په ښه توگه موندلای سي، په دې برخه کي (Lakhiar et al., 2024) هم ورته پايله ترلاسه کړې ده.

د کرنيزي تکنالوژي د استعمال له لاري د زهرجنو درملو دواپاشي او کارونه آسانه کيږي، کرنيز آفات او امراض په آساني سره پيژندل او مخنيوی يې کيږي، (Chattopadhyay et al., 2014) هم د خپلي څيړني پايلي په ورته شکل سره وړاندي کړي دي.

پايله

د څيړني د معلوماتو څخه څرگنده سول چې د کرنيزي تکنالوژي د منلو او استعمال له لاري، د کرنيزو فارمونو په عوايدو کي ښوالی راځي، چې ددې لاري د کروند گرو اقتصادي وده تأمين کوي، د کرنيزو محصولاتو په کيفيت کي کافي ښوالی راولي او د کرنيزو فارمونو د امراضو او آفاتو په پيژندنه او مخنيوي کي د کروند گرو ظرفيت زياتوي، د کرنيزو توليداتو په پروسس کي عصري تکنالوژي مهم نقش لوبولای سي، د کرنيزي تکنالوژي په منلو او تطبيق کي د کروند گرو د ظرفيت لوړوني پروگرامونه مؤثر تماميږي. د فريد من تحليل څخه روښانه سول چې کرنيزه تکنالوژي د کرنيزو محصولاتو د زياتوالي پر عواملو باندې مثبتې اغيزې کوي، داسي چې پر هر عامل باندې ځانگړي او خاصي اغيزې کوي، چې مارکيټ ته په لاسرسي، د کرنيزو پلانونو په تطبيق، تصميم نيونه، د کرنيزو فارمونو په ښوالي او د فارم د حاصل په زياتوالي کي په ترتيب سره زياته اغيزه کوي. د څيړني د پايلي څخه روښانه سول چې د کرنيز سکتور په پرمختگ کي کرنيزه تکنالوژي مهم رول لوبوي، چې په ترتيب سره د خاوري حاصلخيزي په کنترول، د اوبو په ساتنه او تنظيم، د کرنيزو آفاتو او امراضو په کنترول او د آفاتو او امراضو ضد درملو په پاشلو کي مهم رول لوبولای سي. د تيرو څيړنو د معلوماتو د تحليل په نتيجه کي څرگنده سول چې د کرنيزي تکنالوژي کارونه د کرنيزي ځمکي د استعمال په مؤثريت، په کرنيزو فعاليتونو کي د وخت د کموالي، د اقليم د بدلون په وړاندي د مقاومت او د کليوالي سيمو د اقتصاد د پرمختگ سبب کيږي، په داسي حال کي چې د کروند گرو د تعليم کموالي، د وسايلو او کافي ظرفيتونو نشتون د کرنيزي تکنالوژي د منلو په وړاندي خنډونه ايجادوي.

سپارښتني

1. د کروندگرو د ظرفيت لوړوني لپاره دي ترويجي روزنيز پروگرامونه پلان سي، تر څو کروندگر کرنيزي تکنالوژي، لکه عصري کرنيز ماشينونه او نور نوي وسايل ومني او د گټي اخيستنې سمه طريقه زده کړي.

2. د کرنیزو تکنالوژیو د لاسرسي اړوند آسانتیاوې دې زیاتې شي، لکه ارزانه ماشینونه، اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي او عضوي سري، چې له کروندگرو سره د تولید لوړولو په کې مرسته وکړي.
3. د سیمې په کچه دې نمونوي فارمونه جوړ شي، چې پکښې په عملي ډول کرنیزې تکنالوژۍ وکارول شي، ترڅو کروندگر په عملي ډول زده کړه وکړي.
4. د کرنیزو آفتونو او امراضو په کنټرول کې د تکنالوژۍ د استعمال څخه دې په پراخه توګه استفاده وسي، ترڅو د کرنیزو محصولاتو کیفیت او کمیت د امکان تر حده پورې سم سي.

اخځلیکونه

- Abay, K. A., & Hassen, I. S. (2022). Economic Factors Influencing Agricultural Technology Adoption in Ethiopia. *Food Policy*, 112, 102104. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102104>
- Adnan, N., Rehman, H. M., & Alam, M. N. (2025). Exploring agricultural innovation: an empirical investigation of factors influencing the adoption and non-adoption of smart fertilizer technology among farmers in developing countries. *Agriculture & Food Security*, 14(1), 11.
- Akudugu, M. A., Guo, E., & Dadzie, S. K. (2012). Adoption of modern agricultural production technologies by farm households in Ghana: What factors influence their decisions? *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 2(3), 1-13.
- Becerra-Encinales, J. F., Bernal-Hernandez, P., Beltrán-Giraldo, J. A., Cooman, A. P., Reyes, L. H., & Cruz, J. C. (2024). Agricultural extension for adopting technological practices in developing countries: A scoping review of barriers and dimensions. *Sustainability*, 16(9), 3555.
- Chattopadhyay, D., Balachandra, Y., Ashoka, P., Pagire, K. S., Sahu, T. K., Panotra, N., ... & veer Singh, B. (2024). Precision Agriculture Technologies for Early Detection of Crop Pests and Diseases. *UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY*, 45(20), 328-342.
- Evenson, R. E., & Gollin, D. (2003). Assessing the impact of the Green Revolution, 1960 to 2000. *Science*, 300(5620), 758-762.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *Farmers and agriculture*. FAO. <https://www.fao.org>
- Geng, W., Liu, L., Zhao, J., Kang, X., & Wang, W. (2024). Digital technologies adoption and economic benefits in agriculture: A mixed-methods approach. *Sustainability*, 16(11), 4431.
- Getahun, S., Kefale, H., & Gelaye, Y. (2024). Application of precision agriculture technologies for sustainable crop production and environmental sustainability: A systematic review. *The Scientific World Journal*, 2024(1), 2126734.
- Hossen, M. I., Fahad, N., Sarkar, M. R., & Rabbi, M. R. (2023). Artificial intelligence in agriculture: a systematic literature review. *Turk. J. Comput. Math. Educ.(TURCOMAT)*, 14, 137-146.
- Kabato, W., Getnet, G. T., Sinore, T., Nemeth, A., & Molnár, Z. (2025). Towards climate-smart agriculture: Strategies for sustainable agricultural production, food security, and greenhouse gas reduction. *Agronomy*, 15(3), 565.
- Kahan, D., & Arora, S. (2020). Factors Affecting Technology Adoption in Agriculture: A Review. *Journal of Agricultural Science*, 12(3), 1-12. <https://doi.org/10.5539/jas.v12n3p1>
- Kassem, M. A. (2019). The Impact of Agricultural Technologies on Farmer Livelihoods: Evidence from Egypt. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 51(2), 123-134.
- Lakhari, I. A., Yan, H., Zhang, C., Wang, G., He, B., Hao, B., ... & Rakibuzzaman, M. (2024). A review of precision irrigation water-saving technology under changing climate for

- enhancing water use efficiency, crop yield, and environmental footprints. *Agriculture*, 14(7), 1141.
- Nasrat, A. (2022). Agricultural Innovation and Food Security in Afghanistan. *Herat University Journal of Economics*, 9(1), 55–70.
- Pingali, P. (2012). Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(31), 12302-12308.
- Pretty, J. N. (2008). Agricultural sustainability: concepts, principles, and evidence. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1491), 447-465.
- Rogers, E. M. (2010). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press
- Singh, K. M. (2008). An Assessment of Technology Transfer System in Afghanistan: The Case of Balkh and Nangarhar provinces.
- World Bank (2021). *Agriculture and Food Technologies: Impacts on Sustainable Development*. The World Bank Group. Retrieved from: <https://www.worldbank.org40>
- Zaki, M. (2023). The Impact of Agricultural Technology on Crop Productivity in Afghanistan. *Kabul University Research Journal*

The Effects of Agricultural Technology on Farmers' Production: A Case Study of Panjwayi District, Kandahar Province

Asadullah Sadat^{1*}, Shuja Mohammad Kakar², Abdulhadi Wasel¹, Sardar Wali Shirzad³, Sayed Mohammad Kabir Maien⁴

¹Department of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Extension, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

²Department of Agricultural Marketing, Faculty of Economics and Extension, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

³Department of Agricultural Economics and Extension, Faculty of Economics and Extension, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

⁴Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Extension, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: shujakakar5@gmail.com

Abstract

Agricultural technology encompasses a wide range of modern machinery, tools, and advanced practices that significantly enhance farm productivity. This study, conducted as a field-based investigation in several major villages of Panjwayi district in Kandahar province, examines the effects of agricultural technology on farmers' production levels. Data were collected through structured questionnaires administered to farmers who actively used agricultural technologies on their farms. Out of a total of 60 households, 52 were randomly selected for data collection using the Yemeni formula. The data were analyzed using the Friedman Test to assess the impact of technology on agricultural productivity. The findings indicate that the adoption of agricultural technology plays a positive and significant role in improving farmers' production and contributes to the overall development of the agricultural sector. The study recommends improving farmers' access to modern technologies, implementing training programs to enhance technology adoption, promoting practical utilization of technologies, and strengthening their use in controlling agricultural pests and diseases.

Keywords: Agricultural Technology, Agriculture, Farmers, Kandahar, Panjwayi District

د انگورو د نیمه سخت لرگینو قلمو د رینسو پر تولید او وده باندې د کرنيزي مېډيا او

ټپ جوړولو اغېزې

ليکوالان: Hussein et al., 2020

ژباړن: رحيم الله همت خواه¹

¹هارټيکلچر خانگه، نباتي علومو پوهنځی، د افغانستان د کرنيزو علومو او تکنالوژي ملي پوهنتون، کندهار، افغانستان

* د ژباړن ليکوال ايميل ادرس: rahimh21@gmail.com

لنډيز

ياده څېړنه د عراق کيرکوک پوهنتون په کرهڼه پوهنځی کې د 15/12/2019 او 1/5/2020 کلونو په جريان کې تر سره سوه. څېړنه په پلاستيکي شنه خونه کې د اروپايي انگورو پر قلمو د دوه ډوله مېډيا (پيټ ماس، د سيند خاوره) او د درې ډوله ټپونو (بې ټپه، يو ټپ، دوه ټپونه) د اغېزو د مطالعه کولو له پاره د فکتوريل RCBD په ډيزاين، د درې تکرارونو او په هر تجربيو پلاټ کې د پنځه قلمو په درلودلو سره ترسره سوه. د څېړني موندني د SAS V 9.0 سافټوير په واسطه تحليل او د اوسطونو مقايسه د Duncan آزمايښت په واسطه د 0.05 تر ارزښت وړ کچې ترسره سو. د څېړني پايلو وښودل چې پيټ ماس د سيند د خاورې په پرتله، د رينسو او ښاخونو د ودې (د رينبه لرونکو قلمو سلنه، د رينسو اوږدوالی، د رينسو او ښاخونو وچ وزن، د قلمو اوږدوالی او قطر، د پاڼو او نوو ښاخونو شمېر، د ښاخونو اوږدوالی او د پاڼو ساحه) د زياتېدو سبب سو. همدارنگه يو ټپ د نورو ټپونو په پرتله د رينبه لرونکو قلمو د سلني، د ښاخونو او رينسو د وچ وزن، د قلمو د قطر، د پاڼو او نوو ښاخونو د شمېر، د ښاخونو د اوږدوالي، د پاڼې د ساحې، مجموعي کلوروفيل او د نايټروجن د سلني د زياتېدو سبب سو.

کلیدي کلیمې: انگور، ټپ جوړول، کرنيزه مېډيا

سریزه

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين .

اروپايي انگور (*Vitis vinifera* L.) د یخې سیمې بومي نبات دی. په ویتاسیا (Vitaceae) کورنۍ پورې اړه لري، چې 14 جنسونه او تر 100 زیاتي نوعي لري (Moore & Jules, 1996). داسې گومان کېږي چې د انگور بومي ځای د منځنۍ اسیا، توري بحیرې جنوب او کاسپین سمندر تر منځ سیمه ده. په دې سیمه کې د انگورو پېژندل سوي نوعي د امریکا د لویې وچې د کشف مخکې شتون درلود او وروسته د نړۍ نورو برخو ته خپاره سول (Perl et al., 1989). انگور یو له مهمو مېوو څخه دي چې په نړۍ کې په پراخه اندازه کرل کېږي. انگور د زیات غذايي ارزښت په لرولو سره د مهمو مېوو له ډلې څخه شمېرل کېږي، په ځانگړي توگه انگور د مونو سکرایډ او عضوي اسیدونو لوړه اندازه لري. په انگور کې اسیدونه لکه تارتاریک اسید، مالیک اسید، او سټریک اسید شتون لري. سربېره پر دې، د انگورو مېوه ځینې ویتامینونه او معدني مالګې لکه پوتاشیم، مگنیزیم، او کلسیم لري. انگور له نورو مېوو څخه دا توپیر لري چې دا د ویتامین C او ویتامین P بډایه سرچینه ده، چې د دې کمښت د وینې رگونو کمزورتیا لامل کېږي. همدارنگه، انگور یو شمېر داسې عناصر لري چې انزیمونه او هورمونونه فعالوي (Al-Saidi, 2000; Hasan et al., 2019). د عراق د تمدن په تاریخ کې د انگورو کرنه ډېره پخوانۍ ده، او عراقیانو د ډېرې پخوا زمانې څخه د انگورو ونې پېژندلې (Al-Saidi, 2000). په نړۍ کې د انگورو له 10,000 څخه زیات ډولونه موجود دي، او اوس مهال په عراق کې شاوخوا 75 ډولونه شته، چې زیاتره یې د تخم لرونکي انگور دي، او یو لږ شمېر یې بې تخمه دي، خو دا بې تخمه ډولونه په تجارتي بڼه نه کرل کېږي (Al-Saidi, 2000 & AL-Malaki, 2001). انگور اقتصادي اهمیت لري، ځکه چې ډېره گټه لاسته ورڅخه راځي. د انگور تاک په زړه پورې مېوه نیونه د لس کلونو شاوخوا کښي وي، د زیات غذايي ارزښت په لرولو سره د طبی درملني په ډول هم کارېږي. تازه انگور د ریسوراترول (Resveratrol) مرکب لري، چې د پروستېټ سرطان ضد ځانگړتیاوي لري (Hudson et al., 2007). انگور د بشري ژوند یوه مهمه برخه گرځېدلې، ځکه چې اړتیاوي ورته ډېرې سوي او تولیدات یې لکه جوس، میز او تازه مېوه تجارتي ارزښت لري. انگور د ډېرو خلکو او ملتونو لپاره د عاید یو مهم سرچینه ده، چې د دې تولید، بازارموندني، او خرڅلاو څخه گټه اخلي (Al-Dujaili, 1989). د قلمو له لارې تکثیر د انگورو د تولید مهمه طریقه ده، ځکه چې د انگورو ډېر ډولونه تخمونه لري او ځیني یې بې تخمه دي. د دې طریقي له مخې، نوي نیالګي د مورني نبات ته ورته یو شان ځانگړتیاوي لري. دا میتود د انگورو د ساتلو لپاره عام دی، په ځانگړي توگه په هغو سیمو کې چېرې چې د فیلوکسرا (Phylloxera) آفت خطر نه وي، لکه عراق. همدارنگه د قلمو څخه په کوچني ساحه کې زیات شمېر نباتات لاسته راځي (Abo-Aziz & Alwan, 1984). د بوټو د جسمي ودې او نمو پر بهیر یو شمېر فکتورونه اغېز لري، چې تر ټولو مهم یې د کرلو مېلېیا ده، چې د قلمې د رېښې کولو وړتیا اغېزمنوي. له همدې امله، د مناسبې مېلېیا ټاکل اړین دي، ترڅو د اتفاقي (Adventitious) رېښو د تولید کچه لوړه کړي او

د لوړ کیفیت لرونکي رينبي او ساقي (Shoot) سيستم ترلاسه سي (Salaman, 1988). په عراقي خاوره کي د بې شکل (Amorphous) او غير بې شکل کلسيم (Non-Amorphous Calcium) لوړه اندازه لري، چي يا د انفرادي ذراتو په بڼه له خاوري سره گډ وي او يا د خټې او سيلټ (Silt) شاوخوا پوښ جوړوي، چي د رېگ جوړښت ته زيان رسوي. دا لوړ تناسب د خاوري د دانو (Grain Mass) جوړېدل مخنيوی کوي، چي له امله ئې د خاوري منفوذونه/سوري کمېږي (Mahmood et al., 2020). د خاورو د سوريو کمښت تهويه او لنده بل کموي (Al-Ubaidi, 2001). په دې توگه، د کلسيم اغېز د عضوي موادو يا هوميک اسيدونو (Humic Acids) په اضافه کولو سره کنټرول کېدای سي، چي د خاورې جوړښت او سوري بڼه کوي، ترڅو د کلسيم هوميټ (Calcium Humate) او فولويټ (Fulvate) اړيکي رامنځته کړي (AL-Taey et al., 2019). دا طريقه د خاوري مجموعي کثافت کموي، د آيون تبادلې وړتيا تنظيموي، د چاپېريال تودوخه ښه کوي او د غذايي عناصرو تدریجي رسونه اسانه کوي (Burhan & AL-Taey, 2018). هارتمان او همکارانو ئې په 2002 کي څرگنده کړه چي د سکليرنکايما (Sclerenchyma) طبقه، چي د قلمې د پوټکي (Bark) او خارجي قشر (Crust) ترمنځ شتون لري، د رينبو د راڅرگندېدو او ودې لپاره خنډ جوړوي. له همدې امله، د زخم ورکولو (Wounding) له پروسې وروسته، کالوس (Callus) رامنځته کېږي، او کله چي قلمه خپل مواد خارج کړي (lixiviates)، د رينبو توليد او په ټپي سوو انساجو کي حجروي ویش پيلېږي. همدارنگه، د ژوبل سوي برخو حجرات د حجروي وېش (Cell Division) هڅولو لپاره فعالېږي، دا چاره داگزین، کاربوهايډریتونو، او نورو موادو طبيعي توليدني له امله صورت مومي، چي د وينټيليشن (Ventilation) چټکتيا ډېروي. سربېره پر دې، ژوبل سوي انساج اتلين توليدوي، چي د حجروي وېش په تنظيمولو کي مهم رول لري او د اتفاقي رينبو د جوړېدو بهير گړندی کوي (Abdulwahab & Al- Al-Dujaili, 2001).

په دې برخه کي، العلي په 2007 کي څېړنه د (د قلمو د رينبو پر توليد د کرنيزي مېلېيا او اړوند فکتورنو اغېزې) تر عنوان لاندې ترسره کړه او وئې موندل چي د زيتون قلمې د ټپ له امله 61.93% قلمو رينبي توليد کړې او هغه چي نه وې ټپي سوي، 37.13% قلمو رينبي توليد کړې. سربېره پر دې، د رينبو اوسط اوږدوالی 16.08 سانتي متره ثبت سوی. په همدې څېړنه کي، نوموړي دا هم څرگنده کړه، چي د پيټ ماس او د سيند شگه (River Grit) د 1:1 نسبت سره د مېلېيا کارول، د اتفاقي رينبو د ودې پر ځانگړتياوو، لکه د رينبو د تشکيل اندازه او د رينبو په اوسط اوږدوالي، د پام وړ مثبت اغېز لري. د دې موضوع اړوند د څېړنو د کمښت له امله، دا څېړنه ترسره سوی، چي موخه ئې د مناسب کرنيز مېلېيا او غوره ټپ جوړول (Wounding) طريقه موندل دي، ترڅو د انگوړو د رينبي کولو او ودې کچه لوړه سي.

مواد او کړنلاره**الف. د څېړنې ځای او وخت**

یاده څېړنه د عراق کیرکوک پوهنتون، کرهڼي پوهنځی کې د 15/12/2019 او 1/5/2020 کلونو په جریان کې تر سره سوه.

ب. د څېړنې ډیزاین

یاده څېړنه د تصادفي بشپړ بلاک ډیزاین (RCBD) له مخې په دريو برخو تمرکز درلود. هر تکرار (Replicate) پنځه قلمې درلودې، نو د هر چلند د قلمو شمېر 30 دی او د ټولې څېړنې له پاره 90 قلمې کارول سوي. د سیند خاوري او پیټ ماس فزیکي او کیمیاوي ځانگړتیاوي په 1 او 2 جدولونو کې ښودل سوي.

ج. مواد

نیمه سخت لرگیني قلمې د 6-7 کلونو عمر لرونکي مورني نبات څخه چې 2-3 نمونې لري، اخیستل سوي. د قلمو ټولې پانې لري کړل سوي او د قلمې د پای په برخه کې اورده ټپونه (هیڅ ټپ یا بې ټپه، یو ټپ، دوه ټپونه) جوړ کړل سول او قلمې په تور پولیتین کڅوړو کې چې مېلېا (پیټ ماس، د سیند خاوره) پکې شتون درلود، کېښودل سوي.

د. احصائیوي تحلیل

د څېړنې په پای کې (1/5/2020) لاندې ذکر سوي معلومات راټول کړل سول:

1. د قلمې د ریښو سلنه (%): دا سلنه د څېړنې په پای کې د لاندې معادلې له مخې محاسبه سو:

$$\text{د قلمې د ریښو سلنه} = (\text{د ریښې لرونکي قلمو شمېر} / \text{د کرل سوو قلمو شمېر}) \times 100$$
2. د ریښو اوږدوالی (سانتي متر)، د قلمو اوږدوالی او قطر (سانتي متر)، د پانو او د نوي تولید سوو ښاخونو شمېر، د ښاخونو اوږدوالی، او د اتفاقي ریښو او د ریښو د سیستم وچ وزن (کیلوگرام): د قلمو ریښې او زخي په 75 سانتي گراد تودوخه کې په فرنس (furnace) کې وچي کړل سوي، څو وزن ئې ثابت او بیا د حساس ډیجیټل ترازو سره وزن کړل سوي.
3. د قلمو د پانو ساحه (سانتي متر مربع): د قلمو پانې د کمپیوټر د ځانگړي پروگرام په مرسته وکتل سوي، چیري چې سافټویر د سکېنر له لاري د پانو ساحه د خط کش په مرسته معلوموي (Zainal, 2014).
4. کلوروفیل انډیکس: د پانې کلوروفیل د Chlorophyll Meter CCM- 200 په واسطه اندازه سو چې له مخکي معیاري سوی وو (Biber, 2007).
5. د پانو د نایتروجن سلنه (%): د پانو نایتروجن د Micro Kjeldahl په واسطه د AOAC (1980) مېتود له مخې اندازه کړل سو. پانې لومړی وچي، میده او بیا د H_2SO_4 او HClO_4 سره د یو پر څلور تناسب سره تحلیل سوي (Johnson & Ullrich, 1959).

د معلوماتو احصائوي تحليل د ANOVA جدول له مخې د SAS V 9.0 (2001) سافټویر په کارولو سره ترسره او اوسطونه د Duncan's Multiple Range ازماينبت له لاري د Roger Mead & Hasted, 2003 د احتمال له مخي سره پرتله سو.

موندني او مناقشه

د کرنيزي مېډيا اغېزې

د 3 جدول څخه ښکاري چې د قلمو د تکثير پر مهال د مختلف کرنيزي مېډيا د کارولو په واسطه د قلمو په جسمي او د ريښو د ودې په اوسطونو کي څرگند توپير شتون لري. پيټ ماس د سيند د خاوري په پرتله په لاندي ځانگړتياوو باندي ښه اغېز درلود: د ريښه لرونکو قلمو سلنه (29.4)، د ريښو اوږدوالی (39.3)، د ريښو وچ وزن (6.53)، د ساقې او ښاخونو وچ وزن (9.15)، د قلمو اوږدوالی (35.3)، د قلمو قطر (54.5)، د پاڼو شمېر (34.9)، د قلمو نوي ښاخونه (13.5)، د ښاخونو اوږدوالی (10.6) او د پاڼي ساحه (1.66). له بلي خوا د سيند خاوره د پيټ ماس په پرتله د زيات کلوروفيل (4.01) او نايټروجن د سلني (11.9) لامل سو.

د ټپ اغېزې

د 4 جدول څخه څرگندېږي په قلمو کي د ټپ جوړول د قلمو د ريښو او جسمي وده باندي ښکاره اغېز لري. يو ټپ د نورو ټپونو په پرتله په لاندي برخو کي ښه اغېز درلود: د ريښه لرونکي قلمو سلنه (80.9)، د ريښو اوږدوالی (37.1)، د ريښو وچ وزن (15.9)، د ساقې او ښاخونو وچ وزن (22.2)، د قلمو قطر (73)، د پاڼو شمېر (75.7)، د قلمو نوي ښاخونه (68.1)، د ښاخونو اوږدوالی (83.8)، د پاڼي ساحه (9.30)، ټول کلوروفيل (17.9) او د پاڼو د نايټروجن سلنه (96.82). خو د قلمو د اوږدوالي د اوسط په برخه کي د يو ټپ او دوه ټپونو ترمنځ روښانه توپير شتون نه لري، چې د دواړو اوسطونه په ترتيب سره 49.67 سانتي متر او 49.50 سانتي متر دي، چې د مقاييسې د فکتور (40.50 سانتي) په پرتله په ترتيب سره 22.6 او 22.3 زيات دی.

1- جدول: د سيند د خاوري فزيکي او کيمياوي خواص

د تحليل ډول	رېگ (گرام/کيلوگرام)	سيلټ (گرام/کيلوگرام)	کلې (گرام/کيلوگرام)	جوړښت	پي اېچ
د تحليل پايله	60	590	350	سيلتي کلې	7.89
د تحليل ډول	ECds.m ⁻¹	عضوي مواد	شته نايټروجن (گرام/کيلوگرام)	شته فاسفورس (گرام/کيلوگرام)	شته پوتاشيم (گرام/کيلوگرام)
د تحليل پايله	1.34	9.56	1.10	0.15	1.00

د خاوري تجزيه د کيرکوک د کرهني په رياست کي ترسره سوې

2- جدول: د پيټ ماس فزيکي او کيمياوي خواص

پي اېچ	ECds.m ⁻¹	عضوي مواد (گرام/کيلوگرام)	% نايټروجن	% مگنيزيم	P2O %	K2O %	KCl %
6	1.3	8.7	1.5	8	17	20	14

گډې اغېزې

5 جدول ښيي چې د مېډیا او تپونو گډې اغېزې (کرنیزه مېډیا او تپونه) د قلمو او ریښو پر جسمي وده باندې روښانه دي. د یو تپ او پیت ماس کرنیز چاپیریال د ودې په ټولو برخو کې له نورو عواملو څخه ښه دی، لکه: د ریښه لرونکو قلمو سلنه (91.00)، د ریښې اوږدوالی (21.00)، د ریښو وچ وزن (15.67 کیلوگرام)، د ساقي او ښاخو وچ وزن (31.67 کیلوگرام)، د قلمې اوږدوالی (58.67 سانتي متر)، د قلمې قطر (1.13 سانتي متر)، پر قلمه د پاڼو شمېر (88.33)، پر قلمه د ښاخونو شمېر (22.33) او د ښاخونو اوږدوالی (48.67). له بلي خوا د سیند د خاورې او یوه تپ گډې اغېزې د نورو گډو اغېزو په پرتله د زیات مجموعي کلوروفیل (87.73) او د پاڼو د زیات نایتروجن (%6.01) لامل سو، په داسې حال کې چې د سیند خاوره د پاڼې د زیاتي ساحې (26.87 سانتي متر مربع) لامل سو.

د څېړني له موندنو څخه څرگندېږي چې کرنیزه مېډیا د قلمو له پاره نه یوازې لنډه بل او تهویه ښه کوي، د ریښو د ښه تولید سبب هم گرځي. همدارنگه مېډیا د قلمو بیخ ته اکسیجن هم رسوي چې ورسره د غذايي مواد د اکسیدیشن سبب گرځي او د حجروي ویش او د ریښو د څوکو د جوړېدو له پاره انرژي آماده کېږي (Hamudy & Dewab, 1986) نو ځکه د ریښه لرونکو قلمو سلنه زیاته سوه (3 جدول). پیت ماس د مشهورو عضوي موادو له ډلې څخه گڼل کېږي چې د زهکشي او تهویې ښه ظرفیت لري. عضوي مواد د کرنیز مېډیا پر ځانگړتیاوو اغېزه لري، خاوره تجزیه کوي، د زهکشي له پاره سوري خلاصوي، او د تهویې زمينه برابروي. دغه ماده د خاورې د دانه یې جوړښت د سختوالي مخه نیسي او د اوبو ساتلو ظرفیت لوړوي (Touban, 1987 & Lateef et al., 2018). په پایله کې د ریښو ښه وده د جسمي ودې د ښه کېدو سبب گرځي. برسېره پر دې، دغه ماده د خاورې یې ایچ اغېزمنوي، د عضوي تېزابونو تجزیه هڅوي، او د تیزابیت کچه راټیټوي. د خاورې کیمیاوي، فزیکي، او بیولوژیکي ځانگړتیاوې ښه کوي، چې د نایتروجن، فاسفورس، او سلفر په څېر عناصرو ښه سرچینه ده. همدارنگه، عضوي مواد د ځینو مهمو عناصرو (کم لگښت عناصر) د کتاینونو سره کیلېټ (chelating) مرکبات جوړوي او خاوره د رسوب کولو (sedimentation) څخه ساتي (Abo-Dahi & Younis, 1988).

د تپ جوړولو یو له مهمو گټو څخه دا ده چې د قلمو د بیخ د انساجو د جذب سطحې پراخوي، چې په پایله کې د غذايي عناصر او د ریښو لخوا د هورمونونو جذب زیاتوي، چې قلمو د ودې لپاره مثبتې پایله لري (4 جدول). برسېره پر دې، د قلمو په پای کې تپ جوړول د ریښو تولید اسانه کوي د ریښو له پاره د مصرفېدونکي انرژي کچه راکموي (Tawajin, 2004; Abdul Wahab & Dujaily, 2001). داسې گمان کېږي چې تپ حجروي وېش هڅوي او کالس انساجو جوړښت ته لاره هواروي. د کالس رامنځته کېدل د اوبو د ضایع کېدو کچه کموي، د قلمې د تکثیر پر مهال د ناروغیو مخنیوی کوي، او د قلمو د ریښو په تولید کې مهم رول لوبوي (Mohamed, 1985; Noori et al., 2018).

پايله

د دې څېړنې پايله دا ده چې د انگورو ټاک د نيمه سخت لرگينو قلمو له لارې د پيټ ماس کرنيزې مېډيا او د يو ټپ په واسطه په ښه ډول تکثير کېدای سي او کروندگرو ته سپارښتنه کېږي چې د انگورو د تکثير له پاره بايد له همدې چلند څخه کار واخلي.

3- جدول: د انگورو د نيمه لرگينو قلمو پر جسمي وده او ريشو پر وده د بېلابېلو کرنيز مېډيا اغېزې

څېړل سوي پارامترونه	د ريشه لرونکو قلمو سلنه (%)	د ريشو اوږدوالی (سانتي متر)	د ريشو وچ وزن (کيلوگرام)	د قلمې اوږدوالی (سانتي متر)	د قلمې قطر (سانتي متر)	پر قلمه د پاڼو شمېر
کرنيزه مېډيا						
پيټ ماس	71.33 a	17.33 a	12.55 a	53.55 a	0.85 a	54.89 a
د سيند خاوره	55.11 b	12.44 b	11.78 b	39.55 b	0.55 b	40.67 b
څېړل سوي پارامترونه	پر قلمه د ښاخونو شمېر	د ښاخونو اوږدوالی (سانتي متر)	د ساقي او ښاخونو وزن (کيلوگرام)	د پاڼې ساحه (سانتي متر مربع)	د کلوروفيل انډيکس (CCI)	د نايټروجن سلنه (%)
کرنيزه مېډيا						
پيټ ماس	14.89 a	34.78 a	27.89 a	25.65 a	75.90 b	4.87 b
د سيند خاوره	13.11 b	31.44 b	25.55 b	25.23 b	78.95 a	5.45 a

په هر کالم کې مختلف حروف لرونکي اوسطونه په ($P < 0.05$) سره د پام وړ توپير ښيي.

4- جدول: د انگورو د نيمه لرگينو قلمو پر جسمي وده او ريشو پر وده د بېلابېلو ټپونو اغېزې

څېړل سوي پارامترونه	د ريشه لرونکو قلمو سلنه (%)	د ريشو اوږدوالی (سانتي متر)	د ريشو وچ وزن (کيلوگرام)	د قلمې اوږدوالی (سانتي متر)	د قلمې قطر (سانتي متر)	پر قلمه د پاڼو شمېر
ټپونه						
بې ټپه	71.67 b	13.83 b	11.50 b	40.50 b	0.52 c	35.00 c
يو ټپ	76.00 a	17.83 a	13.33 a	49.50 a	0.90 a	61.50 a
دوه ټپونه	42.00 c	13.00 b	11.67 b	49.67 a	0.70 b	46.83 b
څېړل سوي پارامترونه	پر قلمه د ښاخونو شمېر	د ښاخونو اوږدوالی (سانتي متر)	د ساقي او ښاخونو وزن (کيلوگرام)	د پاڼې ساحه (سانتي متر مربع)	د کلوروفيل انډيکس (CCI)	د نايټروجن سلنه (%)
ټپونه						
بې ټپ قلمې	11.00 c	22.67 c	26.83 b	24.19 c	70.47 c	4.98 c
يو ټپ	18.50 a	41.67 a	29.33 a	26.44 a	83.10 a	5.32 a
دوه ټپونه	12.50 b	35.00 b	24.00 c	25.70 b	78.72 b	5.18 b

په هر کالم کې مختلف حروف لرونکي اوسطونه په ($P < 0.05$) سره د پام وړ توپير ښيي.

څپرل سوي پارامترونه	د ریښه لرونکو قلمو سلنه (%)	د ریښو اوږدوالی (سانتي متر)	د ریښو وچ وزن (کيلوگرام)	د قلمې اوږدوالی (سانتي متر)	د قلمې قطر (سانتي متر)	پر قلمه د پاڼو شمېر
بې تپه	81.33 b	17.00 b	11.33 c	47.33 c	0.57 c	33.33 f
پیت ماس	91.00 a	21.00 a	15.67 a	58.67 a	1.13 a	83.33 a
دوه تپه	41.67 d	14.00 c	10.67 c	54.67 b	0.87 b	49.00 b
بې تپه	62.00 c	10.67 e	11.67 c	33.67 f	0.47 d	36.67 e
د سیند خاوره	61.00 c	14.67 c	11.00 c	40.33 e	0.67 c	40.67 d
دوه تپه	42.33 d	12.00 d	12.67 b	44.67 d	0.53 d	44.67 c

څپرل سوي پارامترونه	پر قلمه د بناخونو شمېر	د بناخونو اوږدوالی (سانتي متر)	د ساقي او بناخونو وزن (کيلوگرام)	د پاڼې ساحه (سانتي متر مربع)	د کلوروفیل انډیکس (CCI)	د نایتروجن سلنه (%)
بې تپه	10.33 d	24.00 e	27.67 b	25.98 c	72.27 e	4.83 d
پیت ماس	22.33 a	48.67 a	31.67 a	26.45 b	78.47 c	4.63 e
دوه تپه	12.00 c	31.67 d	24.33 d	24.53 d	76.97 d	5.13 c
بې تپه	11.67 c	21.33 f	26.00 c	22.40 e	68.67 f	5.12 c
د سیند خاوره	14.67 b	34.67 c	27.00 b	26.43 b	87.73 a	6.01 a
دوه تپه	13.00 c	38.33 b	23.67 d	26.87 a	80.47 b	5.23 b

په هر کال کې مختلف حروف لرونکي اوسطونه په ($P < 0.05$) سره د پام وړ توپیر ښيي.

اخځليکونه

- A.O.A.C. 1980. Official methods of analysis 13th of association of ficial analytical chemists – Washington, dc.
- Abdel Wahab, S.A.S. & Jabbar, A.H. Al-Dujaili, 2001. The effect of pens taking, deformation and treatment dates on indole butyric acid on rooting apple apples. *Al-Rafidain Agriculture Journal*. 32 (3), 71-78.
- Abu Aziz, Ab. B. & Th. F. F. Alwan, 1984. The science of cultivating the grapes of the year. Ministry of Higher Education and Scientific Research. Baghdad University.
- Abu Dahi, Y. M. & Al Younis, M.A. 1988. Guide to Plant Nutrition. Ministry of Higher Education and Scientific Research. Baghdad University.
- Al-Ali, H. H. 2007. The effect of indole butyric acid, culture medium and certain treatments on rooting of the olive branch (*Olea europaea* L.). *Al-Anbar Journal of Agricultural Sciences*. 5(1).
- Al-Bakar, A. H. A. Q., Noori, A. M., Hasan, H. M., & Ahmed, A. M. A. (2020). Effect of humic acid and seaweed and number of doses additive on growth and chlorophyll content of seedlings weeping bottlebrush plant. *Plant cell biotechnology and molecular biology*, 21(69–70), 99–104.

- Al-Bakkar, A. H. A. Q., Saleh, Y. M., Lateef, M. A. A., & Noori, A. M. (2021). A study to production of flowers from culturing different weights of Iris Bulbs in Kirkuk City. *International Journal of Agricultural and Statistical Sciences*, 16(1991), 1931–1933.
- Al-Dujaili, J. A. & Salman, M.A. 1989. Grape production, Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Baghdad.
- AL-Malaki, A. R. A. A. A. 2001. Study the specifications of some seedless grape varieties in the central region of Iraq. Unpublished Master Thesis: Baghdad University.
- Al-Saidi, I. H. M. 1982. Cultivation and production of vine- yards. Ministry of Higher Education and Scientific Research. University of Al Mosul: Dar Al Kutub Printing and Publishing Corporation.
- Al-Saidi, I. H. M. 2000. Grape production. Part one, Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Mosul.
- Al-Ubaidi, B. Sh. U. 2001. Various organic sources are drained in the soil and its relationship to limestone. Unpublished Master Thesis. Baghdad University.
- Biber, P.D. 2007. Evaluating a chlorophyll content meter on three coastal wetland plant species. *Journal of Agricultural Food and Environmental Science*. 1(2), 1–11.
- Burhan A. K. & AL-Taey, D. K. A. 2018. Effect of Potassium humate, humic acid, and compost of rice wastes in the growth and yield of two cultivars of Dill under salt stress conditions. *Advances in Natural and Applied Sciences*. 12 (11), 1-6.
- Hammoudi, M. R. & Dayoub, A.H. 1986. Fundamentals of Vegetables and Fruits. Aleppo University Publications: Ibn Khaldun Press. 468 pages.
- Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F.T. and Geneve ,Hasan, J. A. and Salman, M.A. 1989. Grape production. Ministry of Higher Education and Scientific Research. Baghdad University: House of Hikam.
- Hudson, T. S., Hartle, D. K., Hursting, S. D., Nunez, N. P., Wang, T. T.Y., Young, H. A., Arany, P. & Green, J.E. 2007. Inhibition of Prostate Cancer Growth by Muscadine Grape Skin Extract and Resveratrol through Distinct Mechanisms. *Cancer Res*. 67 (17), 8396-8405.
- Hulme, A.C. 1970. The Biochemistry of Fruit and Their Products, Vol. 1. Academic press, N.Y., USA.
- Hussein, S. A., Noori, A. M., & Kanber, H. S. (2020). Stratification period with different agricultural media roll on seeds germination ratio and humic acid fertilization on apricot seedlings *Prunus armeniaca* l. Growth. *Plant cell biotechnology and molecular biology*, 21(71–72), 23–29.
- Johnson, C. M. & Ullrich, A 1959. Analytical Method for Use in Plant Analysis Bulletin 766. University of California Agriculture Experiment station, Berkeley CA.
- Jules, J. & Moore, J.N. 1996. Fruit Breeding. Volume II: Vine and small fruitcrops. John Wiley & Sons. Inc. Lateef, Mohammed Abdul Aziz, Noori, Ali Mohammed, Al-Qadi, Raghad and Mahdi Hadi Muhsin, 2018.
- Mahmood, S.S., Taha, S. M., Taha, A.M. & AL-Taey, D .K.A. 2020. Integrated Agricultural Management Of Saline Soils Ofsowaira, Wasit Governorate. nt. *J. Agricult. Stat. Sci*. 16 (1), 113-119.
- Mohamed, A. K. 1985. Plant Physiology. Part Two. University of Mosul: Higher Education Press.
- Noori, Ali Mohammed, Lateef, Mohammed Abdul Aziz and Mahdi Hadi Muhsin, 2018. Effect of phosphorus and gibberellic acid on growth and yield of grape (*Vitis vinifera* L.). *Res. on Crops*. 19 (4), 643-648.
- Perl, A. & Eshdat, Y. 1998. DNA transfer and gene expression in transgenic grapes. In: Tombs, M.P. (ed) *Biotechnology And Genetic Engineering Reviews*, vol.15. Intercept, Andover, pp 365–386.
- R.L. 2002. *Plant propagation, Principles & Practices*. 7th edition Prentice upper saddle river-Hall, iac., New Jersey.

- Roger Mead, R.N.C. & Hasted, A.M. 2003. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman. Hall, CRC, A CRC Press Co., Washing- ton, D.C.
- Salman, M. A. 1988. Horticulture Propagation. University of Mosul: Directorate of Dar Al-Kutub for Printing and Publishing.
- Theroleof nitrogen & boron fertilizers on growth and yield in pomegranate (*Punica granatum* L.). Plant Archives. 18, 1957-1960.
- Touban, A. M. M. 1987. Decoration plants. Basra University, Ministry of Higher Education and Scientific Research.
- Touban, A. M. M. 2004. The effect of indole butyric (IBA) and its pen type on the ratio of pen rooting and growth to three types of infernal. Bougainvillea spp. *Basra Journal of Agricultural Sciences*. 17 (1), 45-55.
- Zainal, A. M. N. 2014. The effect of Agrihumate and urea spray on some growth characteristics and nutritional content of three seedlings of olives (*Olea europaea* L.). Unpublished Master Thesis. University of Kirkuk, Iraq.

Effect of Different Agricultural Media and Wounding on Rooting and Growing of Grapes (*Vitis vinifera* L.) Semi Wood Cutting

Authors: Hussein et al., 2020

Translator: Rahimullah Himatkhwah^{1*}

¹Department of Horticulture, Faculty of Plant Sciences, Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University, Kandahar, Afghanistan

*Corresponding Author Email Address: rahimh21@gmail.com

ABSTRACT

The study was conducted in Collage of Agriculture / Kirkuk University –Iraq during period of 15/12/2019 to 1/5/2020. The study included influence of two type of cultural media (Peat moss, river soil) and wounding three levels (without wounding, mono-wounds, di-wounds) of European grape cutting under plastic house condition. The factorial experiment arranged using randomized complete block design (R.C.B.D.) with triplicates and five seedlings for each experimental unit. The results were analyzed by using SAS V 9.0 software and the variation of means compared depending on Duncan test for significant level of 0.05. The obtained results can be summarized that Peat moss media significantly increased most of roots and shoots characteristics (percentage of rooted cutting, roots length, dry weight of shoots and roots systems, length and diameter of cutting, numbers of leaves and new branches, branches length and leaf area) on river soil media. While, mono-wounds exhibited a significant superiority on other wounding levels in following characteristics (percentage of rooted cutting, roots length, dry weight of shoots and roots systems, diameter of cutting, numbers of leaves and new branches, branches length, leaf area, total chlorophyll and percentage of Nitrogen).

Keywords: Cultural media, Grapes, Wounding



Zarghoon Nawasht Academic and Scientific Journal
Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University

Vol: 3 Issue no: 1 (June, 2025)

Established Date (2023)

Publishing Authority

Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University (ANASTU)

Chief of Journal

Senior Teaching Assistant Dr. Nawab Nasir

Managing Director

Senior Teaching Assistant Asadullah Sadat

General Manager Design and Editor

Dawlat Khan Muslim

Editorial Board Members

- Assoc. Prof. Nasir Ahmad Nasrat
- Assoc. Prof. Naqibullah Mujadidi
- Assis. Prof. Dr. Aminullah Noor
- Assis. Prof. Dr. Mohammad Dawood Bawer
- Assis. Prof. Ahmadullah Zahir
- Senior Teaching Assistant Dr. Hikmatullah Obaid
- Senior Teaching Assistant Dr. Sharifullah Sharifi
- Senior Teaching Assistant Sardar Mohammad Hashimi
- Senior Teaching Assistant Mohammad Sadiq Salihi

Address: Afghanistan National Agricultural Sciences and Technology University,
Zarghoon Nawasht Journal Office, Kandahar, Afghanistan

www.anastu.edu.af

zarghoon.nawasht@anastu.edu.af

0705477590-0708712689